UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA TUBERCULOSIS
PULMONAR (Revisión de 100 casos de Resección).

TESIS

presentada a la Junta Directiva de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos
de Guatemala

por

JUAN RAFAEL MINERA DE LEON

en el acto de su investidura de:

MEDICO Y CIRUJANO

Guatemala, noviembre de 1964.-

.....PLAN DE TESIS :

INTRODUCCION

- I.- CONSIDERACIONES GENERALES
 - II.- ANATOMIA QUIRURGICA DE LOS PULMONES
 - III.- SELECCION DEL PACIENTE QUIRURGICO
 - IV.- INDICACIONES, CONTRAINDICACIONES Y COMPLICACIONES DE LA CIRUGIA EN LA TUBERCULOSIS PULMONAR
 - V.- TIPOS Y PROCEDIMIENTO OPERATORIO EMPLEADO
 - VI.- CASUISTICA Y ESTADISTICAS
 - VII .- COMENTARIOS
 - VIII.- CONCLUSIONES
- BIBLIOGRAFIA

dos de alta y no teniendo un hogar donde ser acogidos , fueron trasladados al Sanatorio Elisa Martínez de Antigua Guatemala, ignorándose como han evolucionado, en mi opinión, dicha evolución ha de haber sido favorable, ya que en caso contrario, hubieran sido de nuevo referidos al cirujano que los operó. El resto de los casos incluye a aquellos pacientes que no se han presentado a uno no sólo de los controles, contribuyendo lo que he dado en llamar "casos de ausentismo absoluto", para diferenciarlos de aquellos que vienen a uno o varios de sus controles y luego, por razones no determinadas, no vuelven a presentarse a citas posteriores, lo cual podríamos calificar como "ausentismo relativo".

El control post-sanatorial consiste en una evolución periódica global que comprende:

- a. Clinica: historia y examen físico.
- b. Estudios bacteriológicos: exámenes de esputo o lavados gástricos, con cultivos de los mismos e investigación de resistencia a las drogas, si fuera necesario, y
- c. Estudio radiológico: placas corrientes, en distintas posiciones: lordosis, tomograffas, etc.; triada ésta de factores indispensables para poder orientar la conducta a seguir con tales pacientes.

Los resultados obtenidos por estos estudios son anotados y compilados en los archivos del Sanatorio para su ulterior utilización en los mismos controles y para estudios de casuística y estadísticas como el que nos ocupa.

En el presente estudio se expondrá ideas personales - quienes se tomó el trabajo, basadas en la experiencia - tratamiento quirúrgico de la tuberculosis en nuestro medio.

CONSIDERACIONES GENERALES

Las intervenciones quirúrgicas más empleadas actualmente para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar son: la resección pulmonar y la toracoplastia; cada una de ellas tienen indicaciones y contraindicaciones precisas y definidas, pero en ciertas circunstancias llegan a complementarse o ser fruto de decisión durante el propio acto operatorio.

La resección pulmonar es la que más se acerca al tratamiento curativo de la enfermedad, siempre que las condiciones del paciente lo permitan y que la enfermedad se encuentre suficientemente localizada, analizando detenidamente, previa la operación, la posibilidad de que existan lesiones que no sean evidentes en los estudios radiográficos, cosa que sucede muy frecuentemente y que a los cirujanos acostumbrados a estas intervenciones no sorprende, ya que corrientemente llegan a encontrarse tuberculomas de algunos milímetros de diámetro o cavernas con material caseoso de gran positividad bacteriológica que no fueron visualizadas a los rayos X pre-operatoriamente.

Existe también el peligro potencia de lesión residual en el pulmón contralateral e incluso en el lado operado - suelen quedar los ganglios linfáticos que sirvieron de drenaje a la región pulmonar extirpada, que también pueden

ser fuente de origen de reactivación de la enfermedad.-
Lo anterior, con el objeto de aclarar que no se puede, -
aún con intervención quirúrgica, de CURACION sino
de INACTIVIDAD de las lesiones tuberculosas, por lo -
que se impone que deba insistirse suficientemente en el
tratamiento médico post-operatorio que deberá seguir el
paciente que ha sufrido una intervención pulmonar de re-
sección por Tuberculosis.

La Toracoplastia por su parte, fue antes del adveni-
miento de la resección pulmonar, la operación más em-
pleada para tratar la tuberculosis; su importancia ha dis-
minuído desde entonces, pero en medios como el nues-
tro, con los tipos de tuberculosis con los que nos toca -
tratar, con enfermedades de evolución muy larga, loca-
lización extensa, predominio pulmonar bilateral y con -
futuro terapéutico incierto, sigue siendo un procedimien-
to quirúrgico de actualidad y, en determinados casos, -
el único procedimiento que nos llega a proporcionar la
negativización bacteriológica en pacientes profusa y lar-
gamente tratados, con la ventaja de no alterar en extre-
mo la capacidad funcional respiratoria, ni como podría
esperarse, producir deformidad externa muy evidente co-
mo consecuencia de la operación.

II

ANATOMIA QUIRURGICA DE LOS PULMONES.

La técnica actual de la cirugía pulmonar, que con-
siste en ligar por separado las estructuras hiliares, fue
creada hace unos 20 años, sustituyó a la ligadura en -
masa que se efectuaba y rápidamente tomó el lugar que
ocupa en la técnica quirúrgica.

Es obligación del cirujano pulmonar conocer bien
la anatomía de hilio del órgano, la disposición de to-
das y cada una de las estructuras, así como las varieda-
des más frecuentes que pueden encontrarse para poder-
así localizar la lesión, extirparla y conservar en lo po-
sible el tejido sano hasta donde se encuentre indicado,
evitando así las complicaciones tanto operatorias como
post-operatorias.

Creo conveniente describir la anatomía quirúrgica
del pulmón, antes de entrar a considerar las técnicas -
de resección.

Segmentos Broncopulmonares.

Anatómicamente ambos pulmones son semejantes y,
aunque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquier-
do sólo 2, existe en este último equivalentes anatómi-
cos que los igualan. La diferencia principal consiste -

en la ausencia del lóbulo medio en el lado izquierdo, - pero en su lugar, formando cuerpo con el lóbulo superior se encuentra la porción lingular correspondiente. Otra diferencia más acuciosa, es la de que mientras en el lóbulo superior derecho existen 3 ramificaciones del bronqui principal, en el lado izquierdo sólo existen 2, por fusión de los segmentos pulmonares apical y posterior - (bronquio apico-posterior). Lo mismo sucede en los lóbulos inferiores, ya que en el derecho existen 5 segmentos, en el izquierdo hay sólo 4, por no existir en dicho lado el llamado segmento cardíaco o mediobasal.

Las ramificaciones bronquiales para los distintos segmentos pulmonares tienen función independiente, poseyendo cada uno de ellos sus respectivas arteria y vena, - siendo posible identificar bronquio y vasos, sin alterar la fisiología normal de los segmentos vecinos y sin lesionar vasos de importancia.

La terminología de los segmentos broncopulmonares - más aceptada es la de Jackson y Huber, terminología - que facilita la localización más o menos exacta de una lesión pulmonar o bronquial al efectuar estudios broncoscópicos y broncográficos.

SEGMENTOS BRONCOPULMONARES (Jackson y Huber)

Lóbulos	Segmentos pulmonares derechos	Segmentos pulmonares izquierdos
Superior	Apical Posterior Anterior	Apicoposterior Anterior Lingular superior Lingular inferior
Medio	Lateral (Externo) Medial (Interno).	
Inferior	Superior Mediobasal Anterobasal Laterobasal Posterobasal	Superior Anteromediobasal Laterobasal Posterobasal

Los segmentos descritos en el cuadro anterior pueden identificarse en la Fig. No.1.

Lateral View

Lateral View

RIGHT

LEFT

Medial and Basal View

Medial and Basal View

Jackson Huber Nomenclature

JJR

Figura No. 1
Segmentos broncopulmonares.

Hilio Primario

Las estructuras que pasan del mediastino a los pulmones son, de atrás adelante: bronquio principal, arteria pulmonar y venas pulmonares (superior e inferior). - Por debajo del hilio pasa, del mediastino al pulmón, el ligamento pulmonar, reflejo pleural que se extiende hasta la parte interna más baja del pulmón. Del lado derecho, el hilio se relaciona estrechamente con la vena cava superior, parte de la aurícula derecha, nervio frénico y vasos pericardiofrénicos.

La vena ácigos se encuentra por debajo del hilio derecho, luego pasa, formando un cayado, sobre el bronquio principal.

Del lado izquierdo, por delante del hilio, hace prominencia el saco pericárdico que es atravesado por el frénico, la aorta y su cayado rodean el hilio para luego descender por detrás de él.

A ambos lados, por delante de los hilios, los plejos pulmonares anteriores y por detrás, los nervios vagos y las arterias bronquiales.

Vasos pulmonares.

Las arterias segmentarias siguen adosadas a los bronquios respectivos, toman los mismos nombres y se subdividen con ellos; las venas, al contrario, son más intersegmentarias y no guardan tan estrecha relación con los bronquios.

Vasos del pulmón izquierdo.
(Ver figuras 2A y B y 3 C)

Arteria pulmonar izquierda: Cuando abandona el saco pericárdico se halla por encima y algo por delante del bronquio principal izquierdo, luego rodea por detrás el bronquio del lóbulo superior, llega a la cisura interlobar dá ramas para los lóbulos superior e inferior. El tronco apicoposterior nace cuando el tronco principal alcanza el bronquio del lóbulo superior, se divide luego en 2 ramas: apical y posterior, pero pueden nacer dichas ramas en forma independiente del tronco principal directamente, en lugar de hacerlo como tronco común; la rama segmental anterior puede presentar en su nacimiento diversas anomalías de localización. Las ramas lingulares pueden nacer en tronco común o 2 ramas independientes y suelen hacerlo en un plano más inferior que la o las ramas anteriores. El resto del tronco principal de la arteria, sigue su trayecto adosada al bronquio del lóbulo inferior, para terminar en ramas segmentales que siguen a sus respectivos bronquios secundarios.

Venas pulmonares izquierdas: La vena pulmonar superior izquierda es la estructura más anterior del hilio y recibe tributarias del lóbulo superior izquierdo correspondientes a los segmentos apicoposterior, anterior y lingular; todas ellas son superficiales y fáciles de exponer por disección. Como anomalía de la vena lingular inferior, puede vaciarse en la vena pulmonar inferior.

La vena pulmonar inferior se halla por detrás y debajo de la vena pulmonar superior, en la parte más superior del ligamento pulmonar y entre las capas pleurales del mismo. Se expone fácilmente movilizándolo hacia adelante

el lóbulo inferior, al que drena, siendo 2 las tributarias principales: la rama principal y la basal, formada esta última por las tributarias de los 4 segmentos basales.

Vasos del pulmón derecho.
(Ver figuras 3D y 4 E-F)

Arteria pulmonar derecha: Sale del pericardio y se coloca por debajo del bronquio principal, penetra en la cisura horizontal y continúa hacia abajo y afuera, por delante del bronquio del lóbulo superior. Antes de penetrar en la cisura nace el tronco superoexterno que da las ramas apical y anterior; ya en la profundidad de la cisura nace la rama posterior, que lleva dirección ascendente. Variaciones: las ramas apical y anterior pueden nacer por separado en el tronco principal. La arteria ascendente posterior puede nacer de la arteria al lóbulo medio o de la segmental superior.

Las ramas arteriales al lóbulo medio nacen en la parte anteroinferior del tronco principal al nivel en que la arteria pasa por las cisuras horizontal y oblicua. Pueden nacer por separado o haber una tercera rama arterial accesoría. La rama al segmento superior del lóbulo inferior nace al mismo nivel que las del lóbulo medio y las 4 ramas basales nacen antes de penetrar en el parénquima o inmediatamente después.

Venas pulmonares derechas: La vena pulmonar superior derecha se halla por debajo y adelante de la arteria pulmonar, recibe tributarias de los lóbulos superior y medio que, de arriba abajo son: la vena apical anterior que recibe sangre de los segmentos apical y anterior, la

vena inferior que drena también el segmento anterior - (superficie inferior del mismo); por detrás y en tronco común con las anteriores, la vena posterior, que drena el segmento posterior, luego las venas que vienen del lóbulo medio.

La disposición de la vena pulmonar inferior derecha es exactamente igual que su homónima del lado izquierdo.

Las arterias bronquiales nacen de la aorta, de cualquiera de los vasos del cayado o de las intercostales superiores en número de 1 a 3 ramas para cada lado. Se acercan al bronquio principal por detrás, para penetrar en su porción membranosa para dividirse en arterias bronquiales ventrales y dorsales. Las venas bronquiales son pequeñas y sin importancia, desembocan en las venas ácigos y hemiacigos.

Figura No.2
Anatomía del Hilum pulmonar.

Figura No.3
Anatomía del Hilio pulmonar.

Figura No.4
 Anatomía del Hilio-pulmonar.

SELECCION DEL PACIENTE

La resección pulmonar requiere mucha prudencia - al seleccionar el candidato a operar; para esto, lo - más conveniente es emplear un criterio clínico, individualizando cada caso, sin menospreciar el empleo de algunas reglas útiles, que ayudan en la selección quirúrgica que se está efectuando.

Entre los factores más importantes que el tisiocirujano debe tomar en cuenta en la selección de su caso, - creo conveniente mencionar los siguientes:

- a. Tipo de lesión: Deberá ser en lo posible, una lesión localizada, de preferencia única, tratando de descartar la presencia de enfermedad contralateral, sobre todo si se piensa en la posibilidad de extirpar todo un pulmón. Si está indicada cirugía bilateral, deberá hacerse en casos de enfermedad lobular o segmental manifiesta localizada en cada pulmón, sin signos activos de enfermedad y con una reserva funcional respiratoria normal.
- b. Edad: factor de gran importancia: los jóvenes y particularmente los niños, resisten muy bien las intervenciones, incluso bilaterales. En nuestro medio sanatorial, por la condición del paciente, debe actuarse con mucha cautela al indicar cirugía de resección en pacientes mayores de 40 años ya

que son casos que post-operatoriamente pueden llegar a complicarse con insuficiencia respiratoria, paros cardíacos e incluso elevar la tasa de mortalidad quirúrgica y por lo tanto representa un riesgo mucho mayor para el enfermo. Posiblemente en pacientes en mejores condiciones socio-económicas y mejor estado físico, la edad para la resección pulmonar sin mayor peligro, podría ser más alta, como se vé corrientemente en la práctica. En general las dificultades de reexpansión del tejido pulmonar remanente, el enfisema asociado, los problemas de espacio residual y las complicaciones, aumentan en relación directa con la edad.

- c. Estado del paciente: el paciente tuberculoso que debe ser intervenido deberá encontrarse en buen estado general, que su estado nutricional se encuentre restablecido, que los niveles sanguíneos se encuentren dentro de los límites normales, que sus exámenes de evaluación cardiocirculatoria, capacidad funcional respiratoria, pruebas hepáticas y renales sean normales. Clínicamente hablando, bajo el punto de vista de Tuberculosis deberá tratarse de un paciente estabilizado, lo que quiere decir que no haya manifestado sintomatología ni signos de actividad al examen físico, que no haya disminución de peso, que la eritrosedimentación esté normal, que no haya cambios evolutivos a los controles de Rayos X; con respecto a la bacteriología puede dársele menos importancia, ya que en ciertos casos la misma cirugía puede ser la que llegue a negativizar al enfermo.

El tratamiento antituberculoso recibido debe ser considerado para tomar en cuenta de qué drogas se dispone para el tratamiento médico post-operatorio o para ser cauto al intervenir ya que un paciente saturado de medicamentos, no sólo puede haber desarrollado resistencias a los antibióticos usados, sino que también la misma saturación limita las posibilidades terapéuticas post-operatorias.

Así pues, deberán investigarse síntomas y signos de intolerancia a las drogas y resistencias in vitro.

Enfermedades asociadas: de particular importancia y de relativa frecuencia es la asociación Diabetes y Tuberculosis que, como se sabe, una y otra se influyen desfavorablemente en su evolución y tratamiento. Requiere aclaración especial el hecho de que, bajo ningún punto de vista, deberá considerarse a la diabetes como contraindicación de la cirugía para tratar la Tuberculosis, por el contrario, una lesión susceptible de ser reseca debe estimular al cirujano tisiólogo a extirpar ese foco de tanto peligro para el enfermo y, considerarlo así lo más precozmente posible, ya que constituye mayor peligro para el paciente diabético que para el que no lo es.

La Úlcera Péptica es otra asociación con tuberculosis digna de mencionarse, porque se influyen mutuamente y sobre todo porque nos sitúa ante un paciente lábil neurovegetativo, a quien debemos tratar quirúrgicamente de un órgano vital como es el pulmón.

Otro cuidado que debe tenerse en la selección del

paciente candidato a cirugía pulmonar es el de investigar el uso reciente de Corticosteroides como tratamiento de enfermedad tuberculosa o no.

Tuberculosis y embarazo: no contraindica la intervención cuando la paciente se encuentra en condiciones óptimas y la cirugía está indicada, el único cuidado que deberá tenerse es el de no operar - dentro del primer trimestre de embarazo o hacerlo cuando el producto de la concepción ya sea viable.

- e. Condición socio-económica: su importancia consiste sobre todo, en que el paciente tuberculoso es generalmente, persona de nivel socio-económico-bajo, cuyo problema pende de resolución; estamos entonces ante el caso de un paciente a quien la cirugía va a abreviar su estancia lejos de la familia a quien debe sostener o cuidar o quien encontrándose en condiciones quirúrgicas, teme operarse y deberá convencerse que es la única forma como se lograría su curación en término menor.
- f. Personalidad: Deberá valorarse este factor tratando de prever posibles problemas de colaboración - del propio paciente durante el periodo perioperatorio.

La toracoplastia, por su parte, es un procedimiento de colapso que es aplicable en los pacientes - que llenan los requisitos mencionados, en casos quirúrgicos con bacteriología reiteradamente positiva y sin localización de sus lesiones, en pacientes - viejos, etc.; de todas maneras, la toracoplastia -

tiene sus indicaciones precisas como veremos en el capítulo correspondiente, pero exige menos requisitos mínimos que el tratamiento de resección.

IV

INDICACIONES, CONTRAINDICACIONES Y COMPLICACIONES DE LA CIRUGIA PULMONAR POR TUBERCULOSIS

Como se dijo al principio, las intervenciones quirúrgicas más usadas para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar son, al menos en nuestro medio, la cirugía de resección pulmonar y la toracoplastia, por lo que en el curso del presente trabajo me limitaré a mencionar lo pertinente a ellas.

En líneas generales, la resección pulmonar, como también ya se ha mencionado, es el procedimiento que se acierta al tratamiento curativo de la enfermedad, cuando en consideración que la resección elimina el foco de infección por extirpación, mientras que la toracoplastia lo hace por cicatrización dejando el tejido enfermo dentro del organismo.

Indicaciones de Resección Pulmonar.

Tuberculoma: este puede ser manifestación secundaria de una caverna con bronquio obstruido, que secundariamente se llenó de material caseoso, pero también puede ser manifestación primaria de condensación focal caseosa, que puede evolucionar hacia la cavitación secundaria. Estos factores deben orientarnos hacia la deducción de que no forzosa-mente debe existir bacteriología positiva en estos

pacientes. Pueden hacernos sospechar de que se trata de una tumoración pulmonar. La resección es tratamiento obligado en estos casos.

b. Cavidades:

1. Cavidades abiertas con o sin esputo positivo.
 2. Cavidades residuales, generalmente como manifestación de fracaso de la toracoplastia.
 3. Cavidades a tensión: manifestación de un mecanismo o válvula producido por enfermedad bronquial, generalmente tuberculosa. Consecutivamente hay engrosamiento de las paredes de las cavernas haciéndose inaccesibles al tratamiento médico y colapsoterapia.
 4. Cavidades en lóbulos inferiores, que debido a la amplitud de los movimientos respiratorios de dichos lóbulos, su tratamiento es difícil y tiende a recidivar.
 5. Cavernas múltiples refractarias a tratamientos conservadores.
- c. Pulmón destruido: la destrucción puede ser segmental, lobular o unilateral total; requiere extirpación siempre que el resto del parénquima se encuentre libre de enfermedad, factor que se vuelve indispensable cuando la destrucción es de un pulmón completo.
- d. Tuberculosis cavitaria o no, en diabéticos; ya se recalca la importancia de operar a estos enfermos, por lo que no se insistirá más en ello.
- e. Bronquiectasias residuales consecutivas a Tubercu-

losis; pueden ser segmentales, lobulares o más extensas.

Atelectasia: segmental, lobular o más extensa, generalmente debida a broncostenosis por enfermedad bronquial asociada.

Hemoptisis incontrolables por medidas conservadoras; es una indicación relativa, que acarrea un riesgo operatorio muy grande, sobre todo cuando se efectúa por urgencia.

• Cavity o bullae enfisematosa que se rompe, con neumotórax secundario, enfermedad extensa unilateral y pulmón contralateral sano. Indicación relativa.

• Enfermedad bilateral localizada, con función respiratoria normal, que de acuerdo con su localización y extensión puede requerir intervención bilateral en dos tiempos o resolverse en un sólo tiempo mediante el abordaje contralateral por vía transmediastínica anterior.

Contraindicaciones:

- a. Tuberculosis evolutiva.
- b. Pacientes con función respiratoria deficiente.
- c. Enfermedad cardíaca, renal o hepática asociada.
- d. Lesiones contralaterales extensas.

- e. Pacientes tuberculosos irrecuperables.

Complicaciones:

- a. Shock hipovolémico
- b. Hemotórax
- c. Empiema
- d. Problemas de espacio residual.
- e. Fístula broncopleuracutánea.
- f. Infecciones secundarias (de la herida operatoria, urinaria, neumonía, etc.)
- g. Acidosis y alcalosis respiratorias.
- h. Reactivación de lesiones antiguas.
- i. Insuficiencia cardiorespiratoria post-operatoria.
- j. Paro cardíaco.

Indicaciones de Toracoplastia:

Es una operación con indicaciones precisas en Tuberculosis pulmonar con condiciones anatómicas de re-tracción y localización que no pueden ser extirpadas.

- a. Indicaciones por causa pulmonar; pueden ser:

1. Autónoma: cuando se realiza para curar lesión - cavitaria.
2. Complementaria: cuando se practica antes, du-rante o después de una excéresis pulmonar.
3. Sustitutiva: cuando reemplaza a otro procedi-miento de colapso.

Empiema.

Cavidades residuales post-resección (problema de es-pacio residual).

Es la única intervención que puede resolver eficaz-mente las enfermedades pleurales como las dos últimas - mencionadas, cuando el drenaje o la decorticación es- - son contraindicados o hayan sido ineficaces.

Contraindicaciones:

- a. Pacientes niños y jóvenes que no han desarrollado - completamente su sistema óseo ya que puede produ-cir deformidad torácica grave.
- b. Pacientes con enfermedad general asociada grave.

Complicaciones:

- a. Hemorragia y Shock.
- b. Respiración paradójica semejante a la producida por fracturas costales múltiples. Se trata de evitar efec-tuando la operación y varios tiempos y con vendajes

de sostén en el tórax postoperatoriamente.

- c. Fractura de la 1a. o 2a. costilla del lado opuesto. Es complicación rara, sin importancia y que, generalmente pasa desapercibida.
- d. Infecciones secundarias.
- e. Hemotórax o Empiemas.
- f. Acidosis o Alcalosis respiratorias.
- g. Diseminación contralateral.
- h. Paro cardíaco.

V

TIPOS DE RESECCION, CONDUCTA A SEGUIR CON EL PACIENTE .

PROCEDIMIENTO DE RESECCION EMPLEADO EN NUESTROS CASOS

Por razones de espacio y tomando en cuenta que la anatomía analizada en el presente trabajo corresponde únicamente a procedimientos de excéresis, la descripción de los mismos, se limitará a la de estos casos.

Los tipos más frecuentes de intervenciones quirúrgicas en los pulmones son: la Neumectomía, la Lobectomía, la Resección segmental, la Resección en cuña y la Eucleación. En nuestros casos, las usadas más frecuentemente son: la Neumectomía, la Lobectomía y la Resección segmental.

En líneas generales, se ve en la práctica que cuando la enfermedad del parénquima se encuentra más próxima a la pleura visceral, el hilio se encuentra relativamente libre de lesiones; entonces es muy frecuente encontrar múltiples adherencias, más numerosas y más firmes en las áreas donde la enfermedad se localizó, ocasionando sólida fusión de las pleuras parietal y visceral, siendo a veces necesario, durante la disección operatoria separar y seccionar la pleura parietal para evitar así lesionar el pulmón y producir escapes de aire durante la operación o bien romper una caverna que puede haberse adherido a la pared torácica, con el consiguiente peligro de infección y derrame secundario. En caso contrario, cuando encontramos un pulmón más

o menos libre de adherencias, la disección del hilio suele ser difícil, ya que las adherencias entre sus distintos componentes puede llegar a ser tal que lo convierte en una magma fibrosa, de consistencia dura, que dificulta la separación de cada una de las estructuras, con el consiguiente peligro de lesionarlas durante la disección; otro factor que hace más difícil la operación, es la existencia de ganglios peribronquiales formando parte de la lesión.

La Neumectomía: consiste en la extirpación total de un pulmón; útil en casos de pulmón destruido, bronquiectasias masivas unilaterales, etc.; muchas veces no es sino en el propio acto quirúrgico cuando los hallazgos operatorios demuestran enfermedad extensa en el lado operado, que no era evidente a las radiografías, obligando a efectuarla. Requisito indispensable para efectuar la excéresis total de un pulmón, es el de descartar lesión tuberculosa contralateral y una función respiratoria capaz de soportar los requerimientos orgánicos existiendo un solo pulmón. La posición del paciente para la neumectomía es importante; en nuestros casos se usa siempre el decúbito lateral, posición conveniente para el cirujano, pero se corre el peligro de derramar material infectante hacia el pulmón sano y la compresión por el mediastino del pulmón remanente, disminuyendo su ventilación; estos riesgos pueden disminuirse o evitarse mediante el uso de sondas especiales de intubación que tienen por objeto aislar cada pulmón (tubos de Carlens) y por medio de una buena técnica anestésica. La neumectomía es entre resecciones, la de ejecución relativamente más fácil.

La Lobectomía: consiste en la extirpación de uno o más lóbulos pulmonares, es más difícil de efectuar que la neumectomía y requiere mayores cuidados; las ad

herencias que se forman pueden producir interrupción o desaparición de las cisuras interlobares o bien presentar éstas como anomalía congénita sin importancia de los pulmones, pero que, de todas maneras hace necesaria la separación artificial para poder efectuar la lobectomía. La indicación depende, lógicamente de la localización del lobar de la lesión.

Resección Segmental: consiste en la individualización, disección y extirpación de un segmento de lóbulo pulmonar que puede hacerse sola o asociada a una lobectomía; trata de conservar la mayor cantidad posible de tejido pulmonar sano. Como procedimiento quirúrgico, de la tuberculosis pulmonar, actualmente ha perdido aceptación, ya que frecuentemente se ven complicaciones con fistula broncopleurales o reactivación de lesiones vecinas.

La Resección en Cuña: consiste en aislar mediante instrumentos quirúrgicos (generalmente entre pinzas) el área pulmonar enferma, separándola del tejido sano, suturando secundariamente a la extirpación de la lesión, para no dejar áreas cruentas despleuralizadas o escapes de aire. La utilidad de este procedimiento está limitada a lesiones nodulares únicas en la periferia pulmonar y, como estas lesiones no son la regla en tuberculosis, se comprenderá que es poco usado.

Un tipo especial de resección en cuña es la que se efectúa con el instrumento llamado UKL-60, que comprime el tejido pulmonar, al mismo tiempo que lo cierra herméticamente mediante grapas de material especial y

resecando luego el área enferma sin necesidad de sutura.

Conducta a seguir con el paciente.
Procedimiento empleado para la Resección .

Más importante que el procedimiento que se describirá luego, es la conducta a seguir con el paciente durante el período peri-operatorio.

Una vez seleccionado el paciente que va a ser intervenido, debe preparársele adecuadamente tanto física como psicológicamente; la preparación psicológica deberá ser extensiva a los familiares más cercanos, incluso, si el caso lo permite, advertir e instruir acerca de los alcances y riesgos del procedimiento. Si el paciente es un menor de edad, se deberá tener autorización escrita de los padres.

En seguida cerciorarse de que se dispone de los medios necesarios y medicamentos que van a ser empleados durante el período operatorio así como la cantidad adecuada de sangre para reponer las pérdidas. La preparación general y local son detalles de técnica que deben ser cuidadosamente efectuados para evitar al máximo las complicaciones; descartar la presencia de enfermedad infecciosa, hemorrágica o general con anticipación al día de la operación.

En el caso especial de los diabéticos, esta enfermedad deberá encontrarse controlada, requiere cuidados médicos y de enfermería muy especiales, sobre todo durante el post-operatorio, efectuando controles constantes de glicemia y glucosuria para anticiparse a

desenlace desagradable como es un coma en un paciente operado; de ser necesario y de acuerdo con los resultados de los análisis de laboratorio, instituir Insulinoterapia prontamente; hay que prevenir y tratar enérgicamente cualquier infección secundaria.

El anestésista juega un gran papel en la operación; de preferencia deberá ser médico, experimentado en su especialidad y muy cauto y responsable.

El personal paramédico que interviene en la operación debe estar entrenado para este tipo de intervenciones, manteniendo durante toda la operación una persona responsable encargada de pesar las compresas empapadas en sangre que van siendo descartadas, informando constantemente al cirujano y al anestésista del cálculo resultante de la sangre perdida para reponerla por transfusión.

Durante el período post-operatorio, además del control de los signos vitales, llevar el control estricto de ingesta y excreta, vigilar por hemorragia o cualquier otra manifestación de agravamiento del paciente; mantener vías aéreas expeditas mediante aspiración de flemas, cambios de posiciones y maniobras post-operatorias de fisioterapia. Corregir las pérdidas de agua y electrolitos por vía intravenosa durante 24-48 horas y posteriormente, en forma progresiva, reinstituir la dieta normal. Proteger al paciente de infecciones secundarias dando antibióticos post-operatoriamente.

El tratamiento antituberculoso específico debe reinstituirse tan pronto como el enfermo se recupere del trauma quirúrgico, tratamiento que deberá seguirse du-

rante tiempo prudencial de meses e incluso años, de acuerdo con la evolución post-operatoria de cada caso.

Procedimiento empleado:

A grandes rasgos, el procedimiento empleado en nuestros pacientes, con ligeras variantes de técnica, es el que se describirá a continuación:

Con el paciente acostado en decúbito lateral, previa antisepsia y preparación del área donde se va a efectuar la toracotomía, se hace una incisión cutánea en forma de S itálica, que va de la región submamaria, sigue el espacio intercostal escogido (generalmente el 5° o 6°) y rodea el borde interno de la escápula; ya por debajo del tejido celular subcutáneo, la sección muscular en esta posición comprende a los músculos Trapecio, Dorsal ancho, Serrato mayor y Romboides. La hemostasis se efectúa por cauterización eléctrica.

Se identifica la costilla (5a. ó 6a), se respeta su periostio, se cortan las inserciones musculares del borde superior y se entra al tórax por vía intercostal transpleural sin resecar costilla.

Nos encontramos ya dentro de la cavidad pleural y antes de explorar es necesario liberar las adherencias que fijan el pulmón a la caja torácica; las adherencias en un gran porcentaje de los casos son extensas, firmes, muy vascularizadas que requieren laboriosa y muy cuidadosa disección y hemostasis; se dijo ya que, algunas veces, es imposible separar las adherencias por lo que se

es necesario hacer disección subpleural, maniobra y shockeante ya que puede producir hemorragias en forma difícil de cohibir. Una vez liberado el pulmón se valorará el estado del mismo, no siendo raro encontrar numerosas lesiones nodulares o cavitarias que obligan a cambiar la conducta terapéutica a seguir, haciéndose a veces necesaria una neumonectomía, talvez no prevista; si las lesiones son muy amplias optar por una toracoplastia.

En la descripción que nos ocupa, nos tocaría decirnos por hacer una resección: se infiltra con anestésico local los espacios intercostales vecinos y el hilio pulmonar con objeto de evitar reflejos vagovagales. Se procede entonces a la disección cuidadosa de las estructuras del hilio pulmonar, aislándolas e identificándolas previamente a su ligadura; una vez reconocidas conviene, siempre que el caso lo permita, seguir como métodos el de ligar primero las arterias y luego las venas, ya que con ello se detiene el aflujo sanguíneo al tejido pulmonar que va a ser removido, evitando la excesiva ingurgitación y el aumento de la pérdida de sangre durante la operación. Se procede pues, a ligar y seccionar los vasos pulmonares, luego, se disecciona, pinza y secciona el bronquio, que luego debe ser suturado herméticamente; se pleuralizan los muñones residuales, se hace prueba con agua para descubrir y cerrar posibles escapes de aire. En seguida corresponde evaluar las posibilidades de reexpansión del pulmón remanente (si no se ha efectuado neumonectomía); si existiera la posibilidad de problemas de reexpansión, puede ayudársele efectuando una decorticación o paralizando el nervio frénico.

Antes de cerrar la incisión, proteger la cavidad pleu

ral de posibles infecciones colocando antibióticos in situ (Penicilina-Estreptomicina); se coloca tubo endotorácico, que se exterioriza por contraincisión y se conecta a un sello de agua o aparato de succión de tórax.

El cierre no requiere más comentario que el cuidado de unir las estructuras seccionadas lo más aproximado a su disposición original y tratar de hacer cierre herético de la caja torácica para prevenir el enfisema subcutáneo.

VI

CASUISTICA Y ESTADISTICAS

Caso No. 1

ESV. 33 años, masculino. Hospitalización: 1 año 4 meses.

Clasificación de ingreso: T.B.C. pulm. bilateral mod. avanzada activa.

Evolución: Satisfactorios. Gano 24 lbs. de peso.
Bacteriología: Esputo positivo en DAC /
Resto del tiempo negativo.

Tratamiento: DHE // : 223 grs. HAIN /// : 190 grs.
Neumoperitoneo durante 3 meses.

Operación: Lobectomía superior derecha (18-XI-59).

Clasificación de Egreso: TBC pulm, bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia Cirugía).

Controles post-sanatoriales: El 17 -IV-61 clínica, bacteriológica y radiológicamente: estabilizado.

Impresión: despues de 1 año y 5 meses de operado :
INACTIVO.

/ DAC: Corresponde a las iniciales del Dispensario An

Caso No.2

DANB, 32 años, femenino. Hospitalización 9 meses 11 días.

Clasificación de ingreso: TBC pulm. bilateral moderadamente avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria
Bacteriología: NEGATIVA todo el tiempo en el Sanatorio.

Tratamiento: DHE 135 grs. HAIN 120 grs.
Neumoperitoneo una aplicación.

Operación: Resección segmental apicoposterior (LSI) (23-XI-59).

Complicación: Fístula bronco-pleural, que dura varios meses y que cerró sólo con tratamiento médico.

Clasificación de egreso: TBC pulm. bilateral mínima aparentemente inactiva.

Controles post-sanatoriales: el 11-VII-63, clínica, bacteriológica y radiológicamente sin cambio.

Impresión: 4 años post-cirugía INACTIVA.

tituberculoso Central.

// DHE: Corresponde a las iniciales de Dihidroestreptomina, en realidad es una mezcla de estreptomina y Dihidroestreptomina.

// HAIN: Es la Hidrazida del Acido-Iso-Nicotínico.

Caso No.3

RI, 33 años, masculino. Hospitalización: 1 año 11 meses.

Clasificación de Ingreso: TBC pulmonar bilateral moderadamente avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria: Ganó 20 lbs. de peso.
Bacteriología: NEGATIVA casi todo el tiempo en el sanatorio.

Tratamiento: DHE 60 grs.; HAIN 290 grs.; PAS / -
1 000 grs.
Neumoperitoneo por 7 meses.

Operación: Lobectomía superior derecha con freni-copraxia derecha (4-XII-59).

Clasificación de Egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: El 2-XII-63, bacteriológica, clínica y radiológicamente sin cambio.

Impresión: 4 años post-cirugía INACTIVO.

/ PAS Acido Para-Amino Salicílico.

Caso No.4

JMdeA, 39 años, femenino. Hospitalización: 2 años 3 meses.

Clasificación de Ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria.
Bacteriología: Positiva en DAC y a su ingreso al Sanatorio, Negativa el resto del tiempo.

Tratamientos: DHE 150 grs.; HAIN 34 grs.; PAS 5125 grs.
Desarrolló resistencia a DHE después de 2 años de tratamiento.

Operación: Neumonectomía izquierda (14-XII-59).

Clasificación de Egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: El 11-XI-63, evaluación sin cambio.

Impresión: 3 años 11 meses post-cirugía INACTIVA

Caso No.5

TV, 34 años, femenina. Hospitalización: 1 año 3 meses.

Clasificación de Ingreso: TBC pulmonar bilateral moderadamente avanzada activa.

Impresión: Satisfactoria, ganó 6 libras de peso.
Bacteriología: Alternativamente POSITIVA y NEGATIVA. NEGATIVA post-operatoriamente.

Tratamientos: HAIN 75 grs.; PAS 3 500 grs.
Neumotórax izquierdo durante 1 año-4 meses.
Lobectomía superior izquierda en ingreso previo.
Desarrolló resistencia a DHE.

Operación: Lobectomía inferior derecha (26-I-60).

Clasificación de Egreso: TBC pulmonar bilateral mínima, aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Tos productiva, bacteriología y radiología sin cambio (2-XII-60).

Impresión: 11 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.6

CRG, 27 años, femenina. Hospitalización 4 años 10 meses.

Clasificación de Ingreso: TBC pulmonar bilateral muy

avanzada, activa.

Evolución: Favorable, aumento 17 libras de peso.
Bacteriología: POSITIVA durante 5 meses en el Sanatorio, luego NEGATIVA el resto del tiempo.

Tratamientos: DHE 100 grs.; HAIN 150 grs.; PAS 6 100 grs.; Cicloserina (CS) 160 cápsulas.

Operaciones: Lobectomías superior y media derechas (15-VII-62). Toracoplastia Izquierda - (1 (IV-63).

Secuela post-operatoria: Crisis de insuficiencia respiratoria aguda desencadenadas por cualquier noxa infecciosa respiratoria.

Clasificación de Egreso: TBC pulm. bilateral moderadamente avanzada aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Síntomas de intolerancia al PAS, bacteriológicos y radiológicos sin cambio.

Impresión: 1 año 9 meses post-cirugía INACTIVA.

CASO No.7

MdeP, 34 años, femenino. Hospitalización: 3 años 8 meses.

Clasificación de Ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 16 libras de peso.
Bacteriología: en preoperatoria resultados alternos.

Tratamiento: DHE 90 grs.; HAIN 155 grs.; PAS 1 000 grs.
Neumoperitoneo: durante 1 año 7 meses.
Desarrolló resistencia a DHE a los 3 años de Trat.

Operación: Neumonectomía derecha (28-1-60).
Frenicopraxia derecha por problema de espacio residual.

Clasificación de Egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: persiste sin cambio desfavorable.

Impresión: 4 años post-cirugía INACTIVA.

Caso No.8

AGG, 32 años, femenino. Hospitalización: 4 años 6 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy a vanzada activa.

Evolución: Preoperatoriamente favorable, aumentó peso.
Bacteriológicos: POSITIVOS ocasionalmente tanto pre como post-operatoriamente. NEGATIVOS casi todo el tiempo.

Tratamientos: DHE 225 grs.; HAIN 238 grs.; PAS - 3 000 grs. Dipasic 334 grs. Neumoperitoneo.

Operación: Neumonectomía derecha (11-11-60).

Complicaciones y evolución post-operatoria: A los pocos días después de la operación apareció fistula broncopleuraleal, que persistió todo el tiempo, luego se reactivó la lesión en el pulmón remanente, haciendo crisis febriles frecuente y hemoptisis a recidivas, falleciendo a los 3 años 10 meses de una crisis hemoptoica incohercible.

Impresión: A los 3 años 10 meses de la operación FALLECIDA.

Caso No.9

SMG. 30 años, masculino. Hospitalización: 3 años, - 10 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy a avanzada activa.

Evolución: Favorable, aumentó 32 libras.
Bacteriología: POSITIVA reiteradamente. NEGATIVA ocasionalmente.

Tratamiento: DHE 250 grs.; HAIN 175 grs.; PAS 8 500 grs.

Operación: Lobectomía superior izquierda (7-X-59).

Complicaciones y evolución postoperatoria: durante la operación inició con problemas respiratorios, que persistieron después, aumentando progresivamente con manifestaciones de disnea intensa en decúbito, falleció a los 4 días de operado, la necropsia no reportó anomalías viscerales, Falleció por insuficiencia respiratoria post-operatoria.

Impresión: A los 4 días post-cirugía FALLECIDO.

Caso No.10

CA, 25 años, femenino. Hospitalización: 3 años 7 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulm. bilateral moderada activa.

Evolución: Favorable, aumentó peso.
Bacteriología: POSITIVA en DAC y a su ingreso al Sanatorio, - NEGATIVA desde los 3 meses en Sanatorio.

Tratamientos: DHE 200 grs.; HAIN 200 grs; PAS 7 000 grs.; Reazida 125 grs.; Cicloserina 25-25 grs.

-Operación: Lobectomía Superior Izquierda (7-III-60)

Clasificación de Egreso: TBC pulmonar bilateral mínima-aparentemente inactiva (Quimioterapia -Cirugía).

Controles postsanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: Después de 2 años de operada INACTIVA.

Caso No.11

HMR, 37 años, masculino, Hospitalización: 8 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar izquierda moderada activa.

Evolución: Favorable, aumento 12 libras de peso.
Bacteriología: POSITIVA en DAC
NEGATIVA desde su ingreso.

Tratamiento: DHE: 80 grs.; HAIN 10 grs.; PAS 1 500 - grs.

Operación: Resección segmental posterior del lóbulo superior izquierdo (18-III-60).

Clasificación de Egreso: TBC pulmonar izquierda mínima, aparentemente inactiva (Quimioterapia -Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: a los 4 años post-cirugía INACTIVA.

Caso No.12

DPdeB, 38 años, femenino. Hospitalización: 2 años 3 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Favorable, aumento 34 lbs. de peso.
Bacteriología: POSITIVA a su ingreso
NEGATIVA desde los 3 meses en el Sanatorio.

Tratamiento: DHE 195 grs.; HAIN 100 grs; PAS 2 750 - grs.

Operación: Lobectomía superior izquierda y Resección segmental superior (L.I.I.) - (4-IV-60).

Complicaciones: Durante la operación hubo rasgadura accidental de la arteria pulmonar, que fue suturada de inmediato.

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia- Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: a los 4 años post-cirugía INACTIVA.

Caso No.13

JAVE 26 años, masculino. Hospitalización: 1 año 10 meses.

Clasificación de Ingreso: TBC pulmonar bilateral moderada activa.

Evolución: Favorable, peso estable.
Bacteriología: POSITIVA reiteradamente antes de la operación.
NEGATIVA; post-operativamente.

Tratamientos: DHE 25 grs.; HAIN: 175 grs.; PAS - 5 450 grs.
Desarrolló resistencia a DHE al año de tratamiento.

Operación: Lobectomía superior derecha (6-IV-60)

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 2 años 4 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.14

AEF, 22 años, femenino. Hospitalización 3 años 3 meses.

Clasificación de Ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada, activa.

Evolución: Favorable, aumento 18 lbs. de peso.
Bacteriología: POSITIVA en DAC y a su ingreso.
NEGATIVA desde los 3 meses en el Sanatorio.

Tratamientos: DHE 225 grs.; HAIN 225 grs.; PAS - 6 750 grs.
Neumoperitoneo durante 4 meses.

Operación: Lobectomía Superior Izquierda (16-V)

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima
parente inactiva (Quimioterapia- Cirugía)

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 3 años post-cirugía INACTIVA.

Caso No.15

OHAS, 23 años, masculino. Hospitalización: 2 años 6 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada, activa

Evolución: Satisfactoria, peso estable.
Bacteriología: POSITIVA y NEGATIVA
alternativamente.

Tratamientos: DHE: 230 grs.; HAIN 270 grs.; PAS 1 000 grs.; Cicloserina 120 grs. Desarrolló resistencia a DHE a los 2 años de tratamiento.

Operación: Lobectomía Superior Derecha (8-VI-60).

Complicación: Aparición fístula broncopleurales post-operatoria, que persistió hasta su egreso que acaeció al año 11 meses, después de la operación, cuando se fugó; al año 5 meses de su salida, fue reingresado de emergencia

con una crisis hemoptoica masiva y persistencia de la fístula, por donde salía gran cantidad de sangre de la hemorragia pulmonar; falleció a los 2 días de su reingreso a consecuencia de la misma hemorragia.

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada, activa.

Impresión: 3 años 5 meses post-cirugía. FALLECIDO.

Caso No.16

AF, 21 años, femenino. Hospitalización 3 años.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Favorable, aumento 10 libras de peso.
Bacteriología: POSITIVA en DAC
NEGATIVA desde su ingreso al Sanatorio.

Tratamientos: DHE 150 grs.; HAIN 250 grs.; PAS 5 000 grs.

Operación: Neumonectomía Izquierda (28-VI-60).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales. Sin cambio desfavorable.

Impresión: 3 años 10 meses post-cirugía.
INACTIVA.

Caso No.17

EGA, 33 años, femenino. Hospitalización 1 año 4 - meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar izquierda moderada activa.

Evolución: Satisfactoria aumentó 2 libras de peso.
Bacteriología: POSITIVA En DAC
NEGATIVA desde su ingreso al Sanatorio.

Tratamientos: DHE 200 grs.; HAIN 125 grs.; PAS - 5 800 grs.

Operación: Lobectomía superior izquierda (24-VI-60).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar izquierda mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: 22-X-63. Tos productiva, cuadro gripal. Bacteriología NEGATIVA: Rayos X: presencia de imagen redondeada (Tuberculoma) en campo derecho.

Reingreso: El 31 -III-64 con clasificación de TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.
Bacteriología: POSITIVA para bacilos atípicos.
Rayos X: persistencia de imagen redondeada de condensación en campo pulmonar derecho.

Impresión: 3 años 10 meses post-cirugía
REACTIVADA.

Caso No.18

JCR, 52 años, femenino. Hospitalización 10 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Favorable, aumento 11 libras de peso.
Bacteriología: POSITIVA a su ingreso al Sanatorio.
NEGATIVA desde los 3 meses de hospitalización.

Tratamientos: DHE 220 grs.; HAIN 100 grs.; PAS - 3 540 grs.

Operación: Lobectomía superior izquierda (18-VI-60).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 3 años 8 meses INACTIVA.

Caso No.19

IDH, 32 años, femenino. Hospitalización 3 años 1 mes.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Favorable.
Bacteriología: POSITIVA en DAC y a su ingreso.
NEGATIVA el resto del tiempo.

Tratamientos: DHE 200 grs.; HAIN 200 grs; PAS 3 000 grs.

Operación: Lobectomía superior izquierda (21-VII-60).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínimamente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 3 años post-cirugía INACTIVA.

Caso No.20

ARP, 46 años, femenino. Hospitalización 1 año 7 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral derecha moderada activa.

Evolución: Favorable, aumentó 19 libras.
Bacteriología: POSITIVA en DAC y ocasionalmente en el Sanatorio.
NEGATIVA el resto del tiempo.

Tratamientos: DHE 75 grs.; HAIN 200 grs.; PAS 5 500 grs.; Reazida 25 grs.

Operación: Neumonectomía derecha (28-VII-60).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar derecha mínimamente inactiva.

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 3 años 9 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.21

OMA, 29 años, femenino. Hospitalización 4 años.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada, activa.

Evolución: Favorable, aumentó 32 libras.
Bacteriología: POSITIVA a su ingreso al Sanatorio.
NEGATIVA al año 8 meses de hospitaliz.

Tratamientos: DHE 75 grs.; HAIN 150 grs.; PAS 500 grs.; Reazida 75 grs.

Operación: Neumonectomía derecha (25-VII-60)

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable

Impresión: A los 3 años post-cirugía INACTIVA.

Caso No.22

AMAP, 29 años, femenino. Hospitalización: 1 año mes.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Favorable, aumentó 22 libras de peso.
Bacteriología: POSITIVA en su ingreso al Sanatorio.
NEGATIVA desde 5 meses después de su ingreso.

Tratamiento: HAIN 100 grs.; PAS 4 000 grs.
Toracoplastía derecha (12-IV-60).

Operación: Neumonectomía derecha (4-VIII-60).

Complicación y evolución post-operatoria: Adherencias extensas dificultan la disección, obligando a sacrificar la vena ácigos, hemorragia en capa intensa y síntomas de insuficiencia respiratoria por lo que se desentuba 2 horas más tarde de lo acostumbrado.
Fallece esa tarde con cuadro de Shock (hipovolémico) que se comprueba por necropsia.

Impresión: La misma tarde de la operación FALLECIDA.

Caso No.23

MSM, 30 años, femenino. Hospitalización 1 año 11 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria: aumentó 26 libras.
Bacteriología: POSITIVA en Hospital General y en el Sanatorio NEGATIVA desde los 6 meses de su ingreso.

Tratamientos: DHE 100 grs.; HAIN 100 grs.; PAS - 6 500 grs.

Operación: Neumonectomía izquierda (1-VIII-60) -
fue complementado con Traqueostomía -
por cuadro de insuficiencia respiratoria
con buenos resultados.

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima -
aparentemente inactiva (Quimioterapia
-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: A los 3 años 3 meses INACTIVA.

Caso No.24

ECHde P, 29 años, femenino. Hospitalización: 1 año 18
días.

Clasificación de Ingreso: TBC pulmonar izquierda mode-
rada activa.

Evolución: Favorable, peso estable.
Bacteriología: POSITIVA en DAC
NEGATIVA desde su in-
greso.

Tratamientos: DHE 95 grs.; HAIN 95 grs,

Operación: Resección segmental apicoposterior. (LSI) -
(18-VIII-60).

Complicación: Apareció post-operatoriamente fistula -
broncopleural que drenó al exterior, ce

rró con medidas conservadoras.

Clasificación de egreso: TBC pulmonar izquierda mínima
aparentemente inactiva (Quimioterapia
-Cirugía).

Controles post-operatorios (15-VII-63).
Clínicamente: presentó hemoptisis en 3
oportunidades.

Bacteriológicos: Esputo POSITIVO
Rayos X: imágenes de reactivación en
campo inferior izquierdo.

Impresión a los 2 años post-cirugía: REACTIVADA.

Caso No.25

JMA, 28 años, masculino. Hospitalización: 1 años 10 -
meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy a-
vanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumento 7 libras de peso.
Bacteriología: POSITIVA a su ingreso.
NEGATIVA desde 3 me-
ses más tarde.

Tratamientos: DHE: 50 grs.; HAIN 130 grs.; PAS -
5 500 grs.

Operación: Lobectomía superior izquierda (24-VIII-
60).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable

Impresión: 3 años 7 meses post cirugía INACTIVA.

Caso No.26.

JRG, 47 años, masculino. Hospitalización 7 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar muy avanzada activa.

Evolución: Favorable, aumentó peso.
Bacteriología: NEGATIVA reiteradamente.

Tratamientos: DHE 80 grs.; HAIN 50 grs.; PAS 1 000 grs.

Operación: Lobectomía superior izquierda (31-VIII-60).

Clasificación de Egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Disnea de esfuerzo; bacteriología y radiología: sin cambio desfavorable.

Impresión: INACTIVO después de 8 meses de operado.

Caso No.27

AGS, 18 años, masculino. Hospitalización: 4 años 11 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumento 44 libras.
Bacteriología: POSITIVA en Dispensario Antituberculoso Infantil.
NEGATIVA desde su ingreso al Sanatorio.

Tratamientos: DHE 275 grs.; HAIN 400 grs.

Operaciones: Lobectomía superior derecha (26-VIII-60) y Lobectomía Inferior izquierda (18-X-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia y Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 1 año 2 meses post-cirugía INACTIVO.

Caso No.28

JVP, 30 años, femenino. Hospitalización: 3 años 11

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy
zada activa.

Evolución: Favorable, aumentó 22 libras.
Bacteriología: POSITIVA a su ingreso
Sanatorio.
NEGATIVA desde los
ses de hospitalización.

Tratamiento: DHE 100 grs.; HAIN 337 grs.; PAS 13
grs.

Operación: Lobectomía superior izquierda y torace
tía, osteoplástica, tipo Björk (5-IX-60)

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima
parentemente inactiva (Quimioterapia
rugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: a 3 años post-cirugía INACTIVA.

Caso No.29

JBC, 30 años, masculino. Hospitalización: 1 año 7 meses

Clasificación de Ingreso: TBC pulmonar bilateral muy av
zada activa.

Evolución: Favorable, aumento 17 libras de peso.
Bacteriología: POSITIVA a su ingreso-
al Sanatorio.
NEGATIVA desde los 3
meses de hospitalizado.

Tratamientos: DHE 75 grs.; HAIN 125.; PAS 1 350 grs.

Operación: Lobectomía superior izquierda (28-IX--
60).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima
parentemente inactiva (Quimioterapia
-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 3 años 8 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.30

MEO, 30 años, femenino. Hospitalización 2 años 11 me
ses.

Clasificación de Ingreso: TBC pulmonar bilateral muy a
vanzada activa

Evolución: Satisfactoria, aumentó 29 libras de pe-
so.
Bacteriología: POSITIVA a su ingreso-
al Sanatorio
NEGATIVA desde los 2
años 4 meses de hosp. a
la fecha.

Tratamientos: DHE 235 grs.; HAIN 75 grs.; PAS
7 000 grs.

Operación: Toracoplastia y apicolisis izquierda
(28-VI-60).
Lobectomía superior izquierda (10-X-
60).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima
aparentemente inactiva (Quimio-
terapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales sin cambio desfavorable.

Impresión: 2 años post-cirugía INACTIVA

Caso No.31

TABG, 14 años, femenino. Hospitalización: 3 años 1
días.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy
avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 52 libras de pe-
so.

Bacteriología: POSITIVA en Dispensa-
rio Antituberculoso infan-
til.

NEGATIVA desde su in-
greso al Sanatorio.

Tratamientos: DHE 150 grs.; HAIN 175 grs.

Operación: Lobectomía superior derecha (27-X-60)

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima
aparentemente inactiva (Quimio-
terapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambios desfavorables.

Impresión: a los 7 meses de operada INACTIVA.

Caso No.32

ALL, 29 años, femenino. Hospitalización: 3 años 6 -
meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy
avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 27 libras de pe-
so.

Bacteriología: NEGATIVA en DAC y
todo el tiempo en Sa-
natorio San Vicente

Tratamientos: DHE 175 grs.; HAIN 275 grs.; PAS -
5 780 grs.

Operación: Lobectomía superior derecha (31-X-
60).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima
aparentemente inactiva (Quimio-
terapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales sin cambio desfavorable.

Impresión: A los 2 años 9 meses post-cirugía
INACTIVA

Caso No.33

(ver sección de COMENTARIOS)

AMG, 28 años, femenino. Hospitalización: 7 años 9 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral moderada activa.

Evolución: Preoperatoriamente favorable, aumento de peso, buenos resultados del tratamiento en cuanto a la evolución del estado general y del cuadro radiológico, pero la bacteriología persistió alternativamente POSITIVA y NEGATIVA; se efectuó operación de excéresis que se complicó con una fístula broncopleurocutánea, que hasta la fecha no cierra definitivamente; postoperatoriamente estuvo POSITIVA en 3 oportunidades. Además hubo hemoptisis post-operatoria.

Tratamientos: DHE 300 grs.; HAIN 300grs.; PAS - 7 700 grs. Cicloserina 120 caps. Dipasic 179 grs. Presentó síntomas reversibles de intolerancia a la DHE.

Operación:

Lobectomía superior izquierda y Toracoplastia osteoplástica, tipo Björk (21-XT-60).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral moderada aparentemente inactiva.

Controles post-sanatoriales: En el efectuado en junio - 1964; persistencia de la fístula, esputo POSITIVO y rayos X sin cambio demostrable ya que es difícil, por las imágenes fibrosas residuales existentes debajo de la toracoplastia, observar signos de actividad.

Impresión:

A los 3 años 7 meses post-cirugía CASO DE COMPLICACION QUIRURGICA MENOS NO CURADO.

Caso No.34

PHJ, 29 años, masculino. Hospitalización: 2 años 7 meses.

Clasificación de ingreso. TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución:

Satisfactoria, peso estable. Bacteriología: POSITIVA en DAC y en el Sanatorio sólo en una oportunidad 8 meses antes de la operación. NEGATIVA el resto del tiempo.

Tratamientos: DHE 90 grs.; HAIN 200 grs.; PAS - 2 500 grs.; Dipasic 720 tabs. Desarro lló resistencia a DHE a los 6 meses de tratamiento.

Operación: Lobectomía Superior Izquierda (30-XI-60)

Clasificación de Egreso: TBC pulmonar bilateral moderada aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 3 años 2 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.35

TSZ, 27 años, femenino. Hospitalización: 1 año 13 días.

Clasificación de Ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó de peso. Bacteriología: POSITIVA en DAC y a su ingreso. NEGATIVA desde los 2 meses de iniciado el tratamiento médico.

Tratamiento: DHE 80 grs.; HAIN 132 grs. PAS 2000 grs.; Dipasic 450 tabs.

Operación: Neumonectomía izquierda (16-I-61)

Clasificación de Egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 1 año 4 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.36

CHRM, 34 años, masculino. Hospitalización: 3 años 6 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 4 lbs. de peso. Bacteriología: POSITIVA en DAC NEGATIVA desde su ingreso.

Tratamientos: Lobectomía superior derecha (19-I-61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 2 años 8 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.37

(Ver Sección de COMENTARIOS)

AGS, 31 años, femenino. Hospitalización: 4 años 7 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar derecha muy avanzada activa.

Evolución: pre-operatoriamente en forma satisfactoria, aumentó 33 libras de peso; bacteriología positiva, solo en una oportunidad en el Sanatorio, todo el resto del tiempo negativa.

Tratamiento: DHE 100 grs.; HAIN 150 grs.; Cicloserina 50 grs.; PAS 6 200 grs.; Dipasic - 162 grs.

Operaciones: Toracoplastia derecha (13-X-59) y Lobectomía superior derecha (20-I-61)

Complicación operatoria: Operación difícil por las adherencias existentes, que producen gran hemorragia que al final ocasionan la muerte de la enferma por Shock hipovolémico.

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral moderadamente inactiva.

Impresión: el mismo día de la operación FALLECIDA.

Caso No.38

SLvdeS., 35 años, femenino. Hospitalización 2 años 11 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 20 libras de peso.

Bacteriología: POSITIVA en DAC y a su ingreso al Sanatorio. NEGATIVA el resto del tiempo.

Tratamientos: DHE 125 grs.; HAIN 175 grs.; PAS - 6 780 grs. Neumoperitoneo durante 1 año.

Operación: Lobectomía superior izquierda (23-I-61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 2 años 11 meses post-cirugía INACTIVA.

NOTA: Este paciente reingresó y estuvo siendo tratada de nuevo sanatorialmente por sombra sospechosa en campo medio derecho; después de 9 meses de hospitalización egresó con el mismo diagnóstico e impresión de inactividad.

Caso No.39

AMLyL, 22 años, femenino. Hospitalización 7 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral moderada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 4 lbs. de peso
Bacteriología: POSITIVA en DAC
NEGATIVA desde su ingreso al Sanatorio San Vicente, virando hacia la negativización en 5 meses de tratamiento médico dispensarial.

Tratamientos: DHE 60 grs.; HAIN 100 grs.; PAS - -
1 000 grs.

Operación: Lobectomía superior izquierda (30-I--61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 2 años 10 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.40

ADG, 28 años, femenino. Hospitalización 2 años 5 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Muy satisfactoria, aumentó 39 libras de peso.

Bacteriología. POSITIVA en DAC y a su ingreso al Sanatorio se hizo NEGATIVA a partir de los 6 meses de tratamiento médico.

Tratamiento: DHE 140 grs.; HAIN 29 grs.; PAS - -
5 370 grs.

Operación: Lobectomía superior izquierda (10-II-61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima, aparentemente inactiva.

Controles post-sanatoriales: Sin cambios desfavorables.

Impresión: 1 años post-cirugía INACTIVA.

Caso No.41

GAS, 25 años, femenino. Hospitalización 1 año 11 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 27 libras de peso.
Bacteriología: POSITIVA en DAC, fue NEGATIVA al ingreso al Sanatorio San Vicente.

Tratamientos: DHE 148 grs.; HAIN 80 grs.; PAS - - 3 000 grs.

Operación: Lobectomía superior derecha (13-II-61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia -Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin actividad.

Impresión: 3 años post-cirugía INACTIVA

Caso No.42

AAN, 24 años, femenino. Hospitalización 2 años 10 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral moderada activa.

Evolución: Favorable en cuanto al estado general, aumentó 23 libras de peso; la radiología logró su estabilización a los 6 meses de

ro la POSITIVIDAD bacteriológica persistió durante 2 años en su estancia en el Sanatorio.

Tratamientos: DHE 55 grs, HAIN 200 grs.; Dipasic 540 grs.; Neumoperitoneo en DAC

Operación: Lobectomía inferior derecha (17-II-61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia -Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 3 años post-cirugía INACTIVA.

Caso No.43

AEM de R, 33 años, femenino. Hospitalización 3 años 4 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 32 libras de peso
Bacteriología: POSITIVA en DAC, durante 7 meses en el Sanatorio, el resto del tiempo NEGATIVA.

Tratamientos: DHE 172 grs.; HAIN 240 grs.; PAS - - 6 200 grs. Dipasic.

Operación: Lobectomía superior derecha (20-11-

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 3 años post-cirugía INACTIVA

Caso No.44

ASM, 36 años, masculino. Hospitalización: 1 año 7 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar muy avanzada, activa, bilateral.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 5 lbs. de peso.

Bacteriología: POSITIVA en DAC y durante 6 meses en el Sanatorio.
NEGATIVA el resto del tiempo.

Tratamiento: DHE 110 grs.; HAIN 55 grs.; PAS 2 200 grs.; Dipasic 450 tabs

Operación: Lobectomía superior derecha (22-11-61)

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral moderada

aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambios desfavorables.

Impresión: 8 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.45

(Ver Sección de COMENTARIOS).

ACG, 32 años, femenino. Hospitalización: 2 años, 11 meses.

Clasificación de Ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada, activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 17 lbs. de peso.
Bacteriología: Positiva en DAC y a su ingreso al Sanatorio que persistió durante un año y luego Negativa hasta su egreso post-quirúrgico.

Tratamientos: DHE 105 grs.; HAIN 260 grs.; PAS 11, 500 grs.; Dipasic 81 grs. Presentó manifestación reversible de intolerancia a DHE, así como resistencia in vitro a la misma droga, después de un año de iniciado el tratamiento.

Operación: Lobectomía superior izquierda (28-11-61).

-Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral moderada aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: En el correspondiente al 2 de enero 62 llegó refiriendo tos productiva, anorexia, pérdida de peso, la bacteriología resultó positiva al examen de esputo y presencia de imágenes de actividad en el pulmón remanente izquierdo por lo que fue reshospitalizada.

Impresión: 3 años post-cirugía REACTIVADA

Caso No.46

RRL, 33 años, femenino. Hospitalización: 6 meses 11 días.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar izquierda mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia).

Evolución: Satisfactoria; aumentó 11 lbs. de peso. Bacteriología: su bacteriología siempre fue NEGATIVA

Tratamiento: DHE 147 grs.; HAIN 147 grs.

Operación: Lobectomía superior izquierda (6-III-61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar izquierda mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales. Sin cambios desfavorables

Impresión: 3 años post-cirugía INACTIVA.

Caso No.47

IAR, 39 años, femenino. Hospitalización: 4 años 7 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 40 lbs. de peso. Bacteriología: POSITIVA en DAC y en el Snatorio San Vicente durante 8 meses, desde entonces NEGATIVA.

Tratamientos: DHE 125 grs.; HAIN 275 grs.; PAS -- 13 500 grs.

Operación: Lobectomía superior izquierda (7-III-61)

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambios desfavorables.

Impresión: 7 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.48

RGP, 29 años, masculino. Hospitalización: 1 año 6 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 13 lbs. de peso. Bacteriología: POSITIVA en DAC y ocasionalmente durante 6 meses en el Sanatorio, NEGATIVA a partir de entonces, hasta la fecha.

Tratamientos: DHE 227 grs.; HAIN 225 grs.; Dipasac 450 tabs.

Operación: Neumonectomía izquierda (8-III-61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía)

Controles post-sanatoriales. Sin cambios desfavorables.

Impresión: 1 año 6 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.49

(Ver sección de COMENTARIOS)

CAA, 20 años, femenino. Hospitalización: 3 años 3 -

meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada.

Evolución: Preoperatoriamente favorable, aumentó 21 lbs. de peso.

Bacteriología: POSITIVA en DAC y ocasionalmente durante 1 año 8 meses. NEGATIVA el resto del tiempo y a pesar de la complicación que se presentó, durante 8 meses post-operatorios, previos a la salida.

Tratamientos: DHE 75 grs.; HAIN 250 grs.; PAS 550 grs. Desarrolló resistencia a DHE después de 1 año de tratamiento.

Operación: Lobectomía superior derecha. Resección segmental del segmento apical del lóbulo inferior y Toracoplastia osteoplástica, tipo Björk (20-III-61).

Complicación post-operatoria: Fístula broncopleurales.

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral moderada aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Al correspondiente al 20-V-63 la paciente se presentó refiriendo

catarras frecuentes, tos productiva secreción a nivel de la fistula. El puto fue POSITIVO y sin cambio radiológico. Se decidió rehospitalizarla

Impresión: 2 años post-cirugía REACTIVADA.

Caso No.50

MIG, 24 años, femenino. Hospitalización: 1 año 8 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Muy satisfactoria, aumentó 60 lbs. peso.
Bacteriología: POSITIVA en DAC y a su ingreso al Sanatorio viró a NEGATIVA a los 4 meses de tratamiento sanatorial.

Tratamiento: DHE 77 grs.; HAIN 65 grs.; PAS 5 000 grs.; Dipasic 45 grs. Neumoperitoneo durante 4 meses.

Operación: Lobectomía superior y media derechas. (20-VI-61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia -Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 2 años post-cirugía INACTIVA.

Caso No.51

JCR, 7 años, masculino. Hospitalización: 2 años 7 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar moderadamente avanzada probablemente activa.

Evolución: Favorable, aumentó 10 libras.
Bacteriología: NEGATIVA reiteradamente.

Tratamientos: DHE 185 grs.; HAIN 215 grs.

Operación: Lobectomía media e inferior derecha (20-VI-61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia -Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 3 años post-cirugía INACTIVA.

Caso No.52

ADS, 18 años, masculino. Hospitalización: 2 años 6 meses.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 40 lbs. de peso.
Bacteriología: POSITIVA en DAC, pasó a la NEGATIVA los 4 meses de tratamiento, manteniéndose así desde su ingreso al Sanatorio.

Tratamientos: DHE 100 grs.; HAIN 200 grs.; PAS 3 000 grs.

Operación: Lobectomía superior derecha (2-VI-61)

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínimamente aparentemente inactiva (Quimioterapia - Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 1 años post-cirugía INACTIVA.

Caso No.53
(Ver sección de COMENTARIOS).

LP, 20 años, masculino. Hospitalización: 6 años 11 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada, activa.

Evolución: Preoperatoriamente fue satisfactoria,

aumentó 47 libras desde su ingreso a la fecha.

Bacteriológicos: POSITIVO desde VI-57, repitiéndose ocasionalmente hasta Enero/63 - cuando viro a NEGATIVO, manteniéndose así hasta la fecha.

Tratamientos: DHE, 450 grs.; HAIN 590 grs.; PAS - 3 300 grs.

Operación: Lobectomía superior derecha y Resección segmental superior del lóbulo inferior (12-julio-61) Toracoplastia derecha (28-IX-62).

Complicaciones post-operatorias: Fístula broncopleurocutánea, que persiste aún a la fecha.

Evolución post-operatoria: Paciente que por la mala evolución del caso no ha egresado del Sanatorio. Actualmente persiste la fístula, la bacteriología persiste NEGATIVA y la radiografía muestra infiltrado contralateral.

Impresión: 2 años 10 meses NO CURADO.

Caso No.54

PPR, 21 años, femenino. Hospitalización: 3 años 10 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria: peso estable.
Bacteriología: POSITIVA en DAC y en el Sanatorio una sola oportunidad, preoperatoriamente.
NEGATIVA: el resto del tiempo.

Tratamientos: DHE 335 grs.; HAIN 150 grs.; PAS 3 000 grs. Desarrolló resistencia a DHE después de 10 meses de tratamiento.

Operación: Lobectomía Superior derecha y Toracoplastia osteoplástica, tipo Björk (10-VI-61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral moderada aparentemente inactiva (Quimioterapia, Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 2 años 6 meses post-cirugía INACTIVA

Caso No.55

NMM, 17 años, femenino. Hospitalización 4 años.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada, activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 51 lbs. de peso.

Bacteriología: Fue ocasionalmente POSITIVA hasta 1 mes antes de la operación.

Tratamientos: DHE 100 grs.; HAIN 150 grs. Reazida-25 grs. Dipasic 2 160 tabs. Resistencia a DHE a los 3 años de tratamiento.

Operación: Neumonectomía izquierda (11-VII-61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 2 años 9 meses post-cirugía.
INACTIVA.

Caso No.56

RAC, 14 años, femenino. Hospitalización 4 años 6 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral avanzada muy activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 46 lbs. de peso.
Bacteriología: a pesar del tratamiento se presenta en varias oportunidades POSITIVA

durante 2 años de hospitalización. NEGATIVA: el resto del tiempo hasta la fecha.

Tratamientos: DHE 150 grs.; HAIN 250 grs.; PAS 2 250 grs.

Operación: Lobectomías superior y media derecha (22-VIII-61).

Clasificación de egresos: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia -Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 2 años 1 mes INACTIVA.

Caso No.57

ACC, 24 años, masculino. Hospitalización: 2 años 11 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral moderada activa.

Evolución: Favorable, aumentó 3 libras de peso. Preoperatoriamente la bacteriología fue ocasionalmente POSITIVA, ya que sólo viró a negativa después de la operación en forma definitiva.

Tratamientos: DHE 135 grs.; HAIN 160 grs.; PAS 4 050 grs.

Operación: Lobectomía superior derecha (11-X-61)

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia -Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambios desfavorables.

Impresión: 2 años 5 meses post-cirugía
INACTIVA.

Caso No.58

(Ver sección de COMENTARIOS).

ANG, 24 años, femenino. Hospitalización 1 año 9 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral moderada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 9 lbs. de peso. Bacteriología: POSITIVA en DAC y una vez en el Sanatorio para pasar a ser NEGATIVA ^{después} de los 9 meses de tratamiento Sanatorial.

Tratamientos: DHE 50 grs.; HAIN 100 grs.; PAS 3 000 grs.

Operación: Lobectomía superior izquierda y resección del segmento superior del lóbulo inferior.

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia - Cirugía).

Controles post-sanatoriales: El correspondiente al 24-V-63, asintomática, bacteriología POSITIVA y radiológicos: sospecha de cavidad en campo superior izquierdo.

Impresión: A los 2 años post cirugía REACTIVADA.

Caso No. 59

BGdeC, 40 años, femenino. Hospitalización 2 años 2 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Favorable, aumento 27 lbs. de peso. Bacteriología: POSITIVA en DAC NEGATIVA desde los 7 meses de tratamiento médico sanatorial.

Tratamientos: DHE 190 grs.; HAIN 125 grs.; PAS 3 500 grs.

Operación: Resección segmental apicoposterior y an

terior (LSI), resección del segmento superior del lóbulo inferior izquierdo.

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia - Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: a los 2 años de la operación INACTIVA.

Caso No. 60

EOG, 29 años, femenino. Hospitalización: 4 años 4 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa

Evolución: Satisfactoria, aumentó 16 lbs. de peso. Bacteriología: POSITIVA en DAC y en Sanatorio durante 1 año. NEGATIVA el resto del tiempo.

Tratamientos: DHE 190 grs.; HAIN 360 grs.; PAS 9 500 grs.; Dipasic 540 tabs.

Operación: Neumonectomía izquierda (17-X-61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia - Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambios desfavorable

Impresión: 2 años 2 meses de operada INACTIVA

Caso No.61

AGZ, 41 años, femenino. Hospitalización 2 años 1 m

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Favorable, aumentó 17 lbs. de peso. Bacteriología: POSITIVA en DAC y varios exámenes en el Sanatorio, se hizo definitivamente NEGATIVA a los 14 meses de tratamiento sanatorial.

Tratamientos: DHE 150 grs.; HAIN 100 grs. PAS - 4 000 grs. Desarrolló resistencia a DHE a los 2 años de tratamiento.

Operación: Neumonectomía izquierda (23-X-61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente INACTIVA. (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 1 año 9 meses después de la operación INACTIVA.

Caso No.62

(Ver sección de COMENTARIOS)

MJG, 26 años, masculino. Hospitalización 5 meses.

Clasificación de Ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoriamente, peso estable. Bacteriología: POSITIVA en DAC y a su ingreso, NEGATIVA hasta su salida del Sanatorio.

Tratamientos: DHE 155 grs.; HAIN 130 grs.; PAS - 600 grs.; Dipasic 540 tabs.

Operación: Lobectomía superior izquierda (2-XI-61).

Clasificación al egreso: TBC pulmonar izquierda mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: El correspondiente al 16/Nov./62 vino el paciente con fístula broncopleurocutánea. Espu POSITIVO y una cavidad en campo medio-derecho demostrable por Rayos X. Reingresa al Sanatorio donde se encuentra actualmente aún en tratamiento médico.

Impresión: 9 meses post-cirugía REACTIVADA.

Caso No.63

AGC, 16 años, femenino. Hospitalización: 4 años 1 m

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada, activa.

Evolución: Favorable, aumentó 24 lbs.
Bacteriología: POSITIVA en DAI y en el Sanatorio ocasionalmente hasta los 3 años de tratamiento sanatorio. NEGATIVA el resto del tiempo hasta la fecha.

Tratamientos: DHE 175 grs.; HAIN 155 grs.; PAS 3 000 grs.; Dipasic 720 Tabs. Desarrolló resistencia a DHE. Neumotórax derecho.

Operación: Neumonectomía derecha (24-X-61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral moderada aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 3 años post-cirugía INACTIVA.

Caso No.64

(Ver sección de COMENTARIOS).

EAV, 25 años, masculino. Hospitalización: 2 años 6 meses.

Clasificación al ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Favorable, aumentó 6 lbs. de peso.
Bacteriología: reiteradamente POSITIVA.

Tratamientos: DHE 90 grs.; HAIN 160 grs.; PAS 3 500 grs.; Reazida 30 grs. Dipasic 450 tabs. Desarrolló resistencia a DHE.

Operación: Neumonectomía derecha (6-XI-61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa (Neumonectomía derecha).

Complicación: La hemorragia masiva resultante de la liberación de las extensas adherencias-pleurales, determinan la aparición de insuficiencia respiratoria y colapso vascular, lo que ocasiona la muerte a las 4 horas de salida de Sala de Operaciones.

Impresión: a las 4 horas de la operación: FALLECIDO.

Caso No.65

DBde M, 38 años, femenino, Hospitalización: 1 año
meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy
vanzada activa.

Evolución: Favorable, peso estable.
Bacteriología: POSITIVA en DAC y
en el Sanatorio sólo en
una oportunidad. NE-
GATIVA el resto del
tiempo.

Tratamientos: DHE 300 grs.; HAIN 400 grs.; PAS-
2 000 grs.; Neumoperitoneo post-ope-
ratorio.

Operación: Lobectomía superior derecha (7-XI-
61).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral míni-
ma aparentemente inactiva (Quimio-
terapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales. Sin cambio desfavorable.

Impresión: 2 años 3 meses post-cirugía
INACTIVA.

Caso No.66

MPC, 28 años, femenino. Hospitalización: 1 año 9-
meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar derecha mode-
rada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 58 lbs. de pe-
so.
Bacteriología: POSITIVA a su ingreso,
se hizo NEGATIVA a-
los 7 meses de trata-
miento sanatorial.

Tratamientos: DHE 235 grs.; HAIN 175 grs.; PAS -
1 000 grs. Neumoperitoneo post-ope-
ratorio.

Operación: Lobectomía superior derecha (11-XII-
61).

Clasificación de Egreso: TBC pulmonar derecha mínima
aparentemente inactiva (Quimio-
terapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: satisfactorios.

Impresión: 1 años post-cirugía, INACTIVA.

Caso No.67

ACCH, 11 años, femenino. Hospitalización: 1 año 3
meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar derecha modera-
da activa.

Evolución: Satisfactoria, aumento 14 lbs. de peso.
Bacteriología: POSITIVA en el Sanatorio en 2 oportunidades, se hizo NEGATIVA definitivamente a los meses de tratamiento.

Tratamientos: DHE 116 grs.; HAIN 121 grs.

Operación: Lobectomía superior derecha (9-I-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar derecha mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión 2 años post cirugía INACTIVA.

Caso No.68

FPV, 31 años, masculino. Hospitalización: 1 año 6 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 14 lbs. de peso.
Bacteriología: POSITIVA a su ingreso, NEGATIVA desde los 4 meses de tratamiento.

Tratamientos: DHE 125 grs.; HAIN 150 grs.

Operación: Lobectomía superior izquierda (23-II-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral moderada aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambios desfavorables.

Impresión: 2 años post-cirugía INACTIVA.

Caso No.69

MTM, 24 años, masculino. Hospitalización: 2 años 7 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 18 lbs.
Bacteriología: POSITIVA en DAC, NEGATIVA desde los 5 meses de tratamiento.

Tratamientos: DHE 125 grs.; HAIN 100 grs.; PAS 4 240 grs.; Cicloserina 120 caps. Neumoperitoneo durante 2 meses.

Operación: Lobectomía superior izquierda (7-III-62).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable, -

después de su salida.

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral moderada aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Impresión: 1 año 2 meses post-cirugía INACTIVO

Caso No.70

(Ver sección de COMENTARIOS).

JVB, 21 años, masculino. Hospitalización 5 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: La mejoría sintomática no se define, a pesar de que el paciente aumentó 7 lbs; la presencia de hemoptisis incontrolable motivó decisión de Junta Médica de indicar Neumonectomía, que fue considerada en calidad de urgencia; la bacteriología fue persistentemente POSITIVA a pesar de la gran cantidad de tratamiento médico específico administrado desde el Dispensario Antituberculoso.

Tratamientos: No se logró determinar la cantidad que tomó de medicamentos, durante su tratamiento ambulatorio, pero después de 5 años de control en el DAC, incluso desarrolló resistencia a DHE.

En el Sanatorio tomó DHE 50 grs. y PAS 1 000 grs. Neumoperitoneo durante 4 meses.

Operación: Neumonectomía izquierda (14-III-62).

Complicación operatoria: Casi al iniciar la operación hubo Paro cardíaco, que cedió en parte al ser instituidas medidas pertinentes, pero el corazón volvió a entrar en paro, del cual ya no salió. Falleció, sin poder terminar la operación.

Clasificación de Egreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Impresión: durante la operación FALLECIDO.

Caso No.71

MGMS, 22 años, femenino, Hospitalización: 1 año 2 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar izquierda moderada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 8 lbs. de peso. Bacteriología: POSITIVA en DAC y a su ingreso; NEGATIVA desde los 3 meses de tratamiento sanatorial.

Tratamientos: DHE 75 grs.; HAIN 100 grs.; PAS -

2 500 grs. Neumoperitoneo en DAC.

Operación: Lobectomía superior izquierda (2-IV-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar izquierda mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 1 año 3 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.72

CGR, 25 años, masculino. Hospitalización: 2 años 10 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumento 9 lbs. de peso. Bacteriología: POSITIVA a su ingreso. NEGATIVA después de 1 año de tratamiento sanatorial.

Tratamiento: DHE 185 grs.; HAIN 300 grs.; PAS 2 000 grs.; Reazida 100 grs. Neumoperitoneo durante 1 año.

Operación: Lobectomía superior izquierda (27-IV-62)

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral moderada, aparentemente inactiva.

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 2 años post-cirugía. INACTIVA.

Caso No.73

DSdeC, 38 años, femenino. Hospitalización: 4 años 5 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 26 libras de peso. Bacteriología: POSITIVA, reiteradamente durante el período hospitalario previo a la operación. NEGATIVA post-operatoriamente.

Tratamientos: DHE 75 grs.; HAIN 350 grs.; Cicloserina 250 grs.; PAS 6 500 grs.; Dipsic 720 tabs.

Operación: Neumonectomía derecha y toracoplastia osteoplástica (30-IV-62).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 2 años post-cirugía INACTIVA.

Caso No.74

RCP, 33 años, masculino. Hospitalización: 1 año 3 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada, activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 20 lbs.
Bacteriología: POSITIVA a su ingreso y hasta 6 meses más tarde, posteriormente NEGATIVA todo el tiempo.

Tratamientos: DHE 35 grs.; HAIN 95 grs.; PAS - 2 600 grs.

Operación: Resección segmental ápico posterior (LSI) (4-V-62).

Clasificación de Egreso: TBC pulmonar bilateral moderada aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 1 año 1 mes post-cirugía INACTIVA.

Caso No.75

SGC, 18 años, masculino. Hospitalización: 4 años.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada, activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 43 lbs. de peso.

Bacteriología: POSITIVA en Dispensario Infantil NEGATIVA desde su ingreso al Sanatorio.

Tratamientos: DHE 250 grs.; HAIN 270 grs.; PAS - 3 000 grs.

Operación: Neumonectomía izquierda (9-V-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 1 año 11 meses de post-operatorio INACTIVA.

Caso No.76

ODG, 29 años, femenino. Hospitalización: 2 años 2 meses.

Clasificación de Ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Favorable, peso estable.
Bacteriología: POSITIVA en DAC, per

sistió la positividad hasta
3 meses previo a la ope-
ración. NEGATIVA
resto del tiempo, hasta
fecha.

Tratamientos: DHE 85 grs.; HAIN 75 grs.; Cicloserina
90 grs.; PAS 1 000 grs. Resistente a
DHE al año de tratamiento.

Operación: Lobectomía superior derecha (17-V-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima
parentemente inactiva (Quimioterapia-
Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambios desfavorables.

Impresión: 1 año 9 meses INACTIVA.

Caso No.77

RHC, 20 años, masculino. Hospitalización: 2 años 10 --
meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy a-
vanzada activa.

Evolución: Satisfactorios, aumentó 4 lbs.
Bacteriología: POSITIVA a su ingreso.
NEGATIVA después de 9
meses de tratamiento sa-
natorial.

Tratamiento: DHE 235 grs.; HAIN 240 grs.

Operación: Lobectomía superior derecha (7-VI-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima-
parentemente inactiva (Quimioterapia
-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 1 año 7 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.78

ADde J, 36 años, femenino. Hospitalización 1 año 11
meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy a-
vanzada activa. DIABETES MELLITUS

Evolución: Favorable, peso estable.
Bacteriología: NEGATIVA todo el --
tiempo, a excepción de
1 examen de lavado gá-
strico en el Sanatorio --
que fue POSITIVO.

Tratamientos: DHE 115 grs.; HAIN 52 grs.; PAS --
1 000 grs. Presentó síntomas de intole-
rancia a DHE y PAS.

Operación: Neumonectomía izquierda (7-VI-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral moderada aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambios desfavorables.

Impresión: 1 año 7 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.79

(Ver sección de COMENTARIOS).

ORdeD, 40 años, femenino. Hospitalización: 3 años, 18 días.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral moderada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 100 lbs. de peso.
Bacteriología: POSITIVA y NEGATIVA alternativamente antes de la operación.

Tratamientos: DHE 221 grs.; HAIN 175 grs.; PAS - 1800 grs. Desarrolló resistencia a DHE después de 3 años de tratamiento.

Operación: Neumectomía izquierda (14-VI-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Al correspondiente al 8-1-63 se presentó refiriendo anorexia, pérdida de peso, astenia, tos. Esputo POSITIVO y sombras de actividad en el pulmón remanente.

Impresión: 1 año 7 meses REACTIVADA.

Caso No.80

FMM, 10 años, femenino. Hospitalización 1 año 2 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar derecho moderada, activa. Síndrome del lóbulo medio.

Evolución: Favorable, aumentó 30 lbs.
Bacteriología: NEGATIVA reiteradamente desde su ingreso.

Tratamientos: DHE 79 grs.; HAIN 100 grs.; PAS 600 grs.

Operación: Lobectomía media derecha (26-VI-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar derecha mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 1 año 3 meses INACTIVA.

Caso No.81

SCG, 42 años, masculino. Hospitalización 1 año 8 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral moderada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 6 lbs.
Bacteriológicos: POSITIVO en DAC.
NEGATIVO desde su ingreso.

Tratamientos: DHE 325 grs.; HAIN 430 grs.; PAS - 2 600 grs. Dipasic.

Operación: Resección en cuña del segmento ápico-posterior (LSI). Exploración transmediastínica contralateral.

NOTA: Esta operación fue efectuada con el instrumento UKL-60 y televisada en circuito cerrado durante el Congreso Panamericano de Tisiología celebrado en Guatemala en julio 1962 (11-VII-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambios desfavorables.

Impresión: 1 año 5 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.82

MAC, 22 años, femenino. Hospitalización 2 años.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral moderada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 24 lbs.
Bacteriología: POSITIVA en DAC y a su ingreso; NEGATIVA el resto del tiempo en el Sanatorio.

Tratamientos: DHE 175 grs.; HAIN 125 grs.; PAS - 2 000 grs. Dipasic 450 tabs.

Operación: Lobectomías media e inferior derechas. (16-VII-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima, aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: En el correspondiente al 25-XI-63 la radiografía mostró sombra homogénea densa de borde horizontal en la parte superior. El esputo NEGATIVO, sintomatología sin importancia. Esperar cultivos.

Impresión 1 año 10 meses INACTIVA

Caso No.83

CVvda. de R., 52 años, femenino. Hospitalización 11 meses 15 días.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa. DIABETES MELLITUS

Evolución: Satisfactoria post-operatoriamente que la paciente ingresó para ser operada de inmediato. POSITIVA en cultivo 2 años antes de su ingreso, NEGATIVA desde los 6 meses de tratamiento médico específico.

Tratamientos: DHE 50 grs.; HAIN 50 grs.; Isobenzocicl, 1400 tabs.

Operación: Resecciones en cuña ápico posterior de ambos lóbulos superiores, el izquierdo a través de exploración transmediastínica mediante el uso de UKL-60.

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínimamente aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 1 año 9 meses post-cirugía INACTIVA

Caso No.84

ITY, 38 años, masculino. Hospitalización 11 meses 15 días.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 10 libras. Bacteriología: POSITIVA en DAC, a su ingreso y un cultivo de lavado gástrico post-lobectomía. NEGATIVA el resto del tiempo.

Tratamientos: DHE 75 grs.; HAIN 25 grs.; PAS 1 340 grs.

Operaciones: Lobectomía superior derecha (24-VII-62) y Toracoplastia derecha (10-V-63).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral moderadamente aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambios desfavorables.

Impresión: 1 año 7 meses post cirugía INACTIVA.

Caso No.85:

EA, 12 años, femenino, Hospitalización: 2 años 9 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral moderada activa.

Evolución: Favorable, aumentó 45 libras.
Bacteriología: POSITIVA en DAI,
NEGATIVA desde su ingreso al Sanatorio.

- Tratamientos: DHE 45 grs.; HAIN 155 grs.; PAS 60 grs.

Operación Lobectomía superior derecha (9-VIII-62)

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia - Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 1 año 5 meses INACTIVA.

Caso No.86

EJGM, 37 años, femenino. Hospitalización: 6 años 5 - meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 40 lbs.
Bacteriología; POSITIVA en DAC y en el Sanatorio desde su ingreso hasta unos 5 años

después de tratamiento-sanatorial.

NEGATIVA en forma intercalada con los resultados anteriores y definitivamente 9 meses antes de la operación.

Tratamientos: DHE 200 grs.; HAIN 315 grs.; PAS - 2 640 grs. Dipasic 1 440 tabs. Resistencia a DHE a 4 años de tratamiento.

Operación: Neumonectomía derecha (28-VIII-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia - Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambios desfavorables.

Impresión: 1 año 8 meses post cirugía INACTIVA.

Caso No.87

MAOP, 36 años, femenino. Hospitalización: 1 año 3 - meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral moderada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 19 lbs.
Bacteriología: En DAC y a su ingreso -

POSITIVA; se hizo NEGATIVA desde los 10 meses de tratamiento sanatorio

Tratamientos: DHE 125 grs.; HAIN 75 grs.; PAS 1 000 grs.

Operación: Lobectomía superior derecha (31-VI-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable

Impresión: 1 año 1 mes INACTIVA.

Caso No.88

(Ver Sección de COMENTARIOS).

SPA, 24 años, femenino. Hospitalización 1 año 8 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó peso.
Bacteriología: POSITIVA en DAC y a su ingreso.
NEGATIVA a los 5 meses de tratamiento médico sanatorial.

Tratamientos: DHE 100 grs.; HAIN 175 grs.; PAS 2 600 grs. Desarrolló resistencia a DHE.

Operación: Lobectomía superior izquierda (4-IX-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: En el correspondiente a marzo/64, refiere anorexia, pérdida de peso, a la radiografía, sin actividad evidente, pero sospechándose la presencia de una cavidad en el pulmón izquierdo remanente.

Impresión: 1 año 3 meses REACTIVADA.

Caso No.89

(Ver sección de COMENTARIOS).

ZMAL, 53 años, femenino. Hospitalización. 2 años - 10 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Favorable: aumentó 17 lbs. de peso.
Bacteriología: POSITIVA y NEGATIVA, alternativamente durante todo el tiempo antes de la operación.

Tratamientos: DHE 315 grs.; HAIN 207 grs.; PAS 2 000 grs.; Dipasic 30 tabs.; Reazida 60 grs.

Operación: Resección segmental apical y posterior derechos (24-IX-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral moderada aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: En junio /64 tos intensa, productiva, hemoptisis durante varios días, por lo que fue reingresada.

Impresión: 1 año 9 meses REACTIVADA.

Caso No.90

(Ver Sección de COMENTARIOS).

GCG 36 años, femenino. Hospitalización 3 años 4 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Favorable, aumentó 13 lbs. de peso. Bacteriología: Alternativamente POSITIVA y NEGATIVA durante 2 años 3 meses de tratamiento sanatorial, hasta 5 meses antes de la operación.

Tratamientos: DHE 240 grs.; HAIN 290 grs.; PAS -

2 940 grs. Dipasic 360 tabs.

Operación: Lobectomía superior derecha (9-X-62).
Toracoplastía derecha (25-III-63).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: el 9 de enero/64: 6 días de esputos hemoptoicos. Esputo POSITIVO
Rayos X: sombra densa bajo la Toracoplastía.

Impresión: 1 año 6 meses de la Resección REACTIVADA.

Caso No.91

(Ver sección de COMENTARIOS).

CGV, 34 años, femenino. Hospitalización 2 años 5 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral moderada activa.

Evolución: Favorable, aumentó 17 libras de peso. Bacteriología: POSITIVA en varias oportunidades en DAC. NEGATIVA desde su ingreso.

Tratamientos: DHE 75 grs.; HAIN 105 grs.; PAS 5 000 grs. Presentó manifestaciones reversibles de intolerancia a la DHE.

Operación: Neumectomía izquierda (8-XI-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral moderada aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: El 3-I-64: Tos productiva. Disminución de peso. Espudo POSITIVO. Rayos X sin cambio.

Impresión: 1 año 2 meses post cirugía REACTIVADA.

Caso No.92

(Ver sección de COMENTARIOS).

CHL, 30 años, masculino. Hospitalización: 3 años 6 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Preoperatoria satisfactoria, aumentó peso.
Bacteriología: POSITIVA reiteradamente desde su ingreso hasta 3 meses antes de la resección; reapareció POSITIVA postlobectomía complicada. NEGATIVA desde hace 10 meses.

Tratamientos: HAIN 330 grs.; DHE 225 grs.; PAS -- 2 340 grs. Resistente a DHE al año de tratamiento.

Operaciones: Lobectomía superior izquierda (12-XII-62). Toracoplastía izquierda (17-V-63)

Clasificación actual: TBC pulmonar bilateral avanzada-activa (Quimioterapia-LSI).

Complicación y evolución post-operatoriamente: Fístula broncopleurocutánea que apareció antes de 8 días post-operatorios y que persiste a la fecha, que motivó la indicación de efectuar Toracoplastía después de la lobectomía, operación que no ha logrado influir sobre la fístula en forma favorable.

Impresión: 3 años 5 meses post lobectomía NO CURADO

Caso No.93

LAGC, 23 años, femenino. Hospitalización: 1 año 4 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar izquierda muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 9 libras de peso.
Bacteriología: POSITIVA a su ingreso. NEGATIVA desde los 11 meses de tratamiento médico sanatorial.

Tratamientos: DHE 150 grs.; HAIN 75 grs.; PAS 2 340 grs. Presentó síntomas reversibles de tolerancia a DHE.

Operación: Resección segmental apico-posterior (LS!) (2-X-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar izquierda mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia -Cirugía).

Controles post-sanatoriales: En controles de nov. y dic del 63, lavados gástricos directos POSITIVOS, pero ya en abril 64 se negatizaron; no han habido cambios clínicos ni radiológicos.

Impresión: 1 año 4 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.94

EECB, 15 años, femenino. Hospitalización: 10 meses - 25 días.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral activa.

Evolución: Satisfactoria: aumentó 28 libras.
Bacteriología: POSITIVA en DAC y a su ingreso.
NEGATIVA el resto del tiempo.

Tratamientos: DHE 75 grs.; HAIN 75 grs.; PAS 600 grs.

Operación: Lobectomía superior derecha (11-X-62)

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia -Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 10 meses post-cirugía INACTIVA.

Caso No.95

NJMdeS, 31 años. femenino, hospitalización: 4 años - 4 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 46 lbs. de peso.
Bacteriología: fue durante todo el tratamiento preoperatorio - alternativamente POSITIVA y NEGATIVA.

Tratamiento: DHE 105 grs.; HAIN 275 grs.; PAS - 9 840 grs.; Cicloserina 60 caps. Dipasid 900 tabs. Resistencia a DHE después de 2 años de tratamiento. Neumoperitoneo.

Operación: Resección en cuña, segmento posteroapical (LSI) (10-XII-62).

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambios desfavorables.

Impresión: 1 año post-cirugía INACTIVA.

Caso No.96

AG, 33 años, masculino. Hospitalización: 1 año 2 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral moderada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó de peso. Bacteriología: POSITIVA en DAC y en su ingreso, NEGATIVA el resto del tiempo.

Tratamientos: DHE 100 grs.; HAIN 125 grs.; PAS 1 200 grs.

Operaciones: Lobectomía superior derecha (14-XII-62)
Toracoplastia derecha (15-V-63).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Sin cambio desfavorable.

Impresión: 1 año 2 meses post-lobectomía INACTIVO.

Caso No.97

PA de 1, 35 años, femenino. Hospitalización: 6 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral moderada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 20 lbs. de peso. Bacteriología: reiteradamente NEGATIVA.

Tratamiento: 50 grs. de HAIN

Operación: Lobectomía superior izquierda (11-XII-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: sin cambio desfavorable.

Impresión: 1 año post-cirugía INACTIVA.

Caso No.98

SVT, 27 años, masculino. Hospitalización 6 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 7 libras de peso.
Bacteriología: POSITIVA en DAC
NEGATIVA desde su ingreso al Sanatorio.

Tratamientos: HAIN 50 grs. y PAS 1 200 grs.

Operación: Lobectomía inferior izquierda (18-XII-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínimamente aparentemente inactiva (Quimioterapia -Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Estabilizados.

Impresión: 1 año 4 meses post-cirugía INACTIVO.

Caso No.99

RVM, 19 años, masculino. Hospitalización: 1 año 1 mes.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Satisfactoria, aumentó 10 lbs. de peso.
Bacteriología: POSITIVA en DAC, NEGATIVA desde su ingreso.

Tratamientos: DHE 25 grs.; HAIN 125 grs.; Pas 2 800 grs. Se presentaron trastornos reversibles de intolerancia a la DHE.

Operación: Neumonectomía izquierda (29-XII-62).

Clasificación de egreso: TBC pulmonar bilateral mínimamente aparentemente inactiva (Quimioterapia -Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Estables.

Impresión: 1 año 1 mes INACTIVA.

Caso No.100

(Ver sección de COMENTARIOS)

ARR, 42 años, masculino. Hospitalización: 2 años 7 meses.

Clasificación de ingreso: TBC pulmonar bilateral muy avanzada activa.

Evolución: Favorable, aumentó 12 libras de peso.
Bacteriología: POSITIVA en el Sanatorio durante 1 año 7 meses desde su ingreso.
NEGATIVA el resto del tiempo.

Tratamientos: DHE 225 grs.; HAIN 150 grs.; PAS 3 540 grs.. Neumotórax izquierdo durante 7 meses.

Operación: Lobectomía superior izquierda y decorticación (27-III-63).

Clasificación de Egreso: TBC pulmonar bilateral mínima aparentemente inactiva (Quimioterapia-Cirugía).

Controles post-sanatoriales: Al correspondiente al 6-II-64 se presentó refiriendo tos matutina productiva. El esputo fue POSITIVO, Rayos X, aparentemente sin cambio. La Junta Médica ordenó su rehospitalización.

Impresión: 1 año post-cirugía REACTIVADO.

CUADRO No.1

ESTUDIO DE 100 CASOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR EN RELACION DE EDAD SEXO Y FORMA CLINICO-RADIOLOGICA DE SU ENFERMEDAD, QUE FUERON TRATADOS POR PROCEDIMIENTOS DE RESECCION PULMONAR.

Edad	Forma Clínico -Radiológica						T o t a l e s		Total Gen.	%
	Mínimas		Moderadas		Avanzadas		Sub-total			
	Hom.	Muj.	Hom.	Muj.	Hom.	Muj.	Hom.	Muj.		
de 14	0	0	1	3	0	2	1	5	6	6
15 a 24	0	0	1	6	9	9	10	15	25	25
25 a 34	0	1	4	8	13	19	17	28	45	45
35 a 44	0	0	2	3	4	11	6	14	20	20
45 a 54	0	0	0	1	0	3	0	4	4	4
Suma	0	1	8	21	26	44	34	66	100	
Totales		1		29		70		100		
%		1		29		70		100		

Analizando el Cuadro No.1 podemos observar el alto porcentaje de formas avanzadas en el momento de ingreso del paciente al Sanatorio, contrastando con el bajo porcentaje de formas mínimas. Se puede notar también el predominio del sexo femenino en nuestros casos, lo cual podría atribuirse en parte, a la existencia en el Sanatorio de 2 salas de Cirugía de Mujeres por sólo una de Cirugía de Hombres. Nos pone de manifiesto también el hecho ya conocido de la incidencia de la enfermedad en la edad media de la vida y con mayor porcentaje en nuestra casuística del período comprendido entre los 25 a los 34 años, descendiendo en forma proporcional dicho porcentaje conforme aumenta o disminuya la edad del paciente.

CUADRO No.2

ESTUDIO DIFERENCIAL DE 100 CASOS DE RESECCION PULMONAR POR TUBERCULOSIS, DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS Y SU RELACION CON EL SEXO Y LA EDAD DE LOS PACIENTES.

Edad	RESECCIONES												TOTALES		Total general	%
	Neumonect.		Lobectomía.		Segmentect.		Bilobectomía		Lobectomía Segmentect.		Resección en cuña		Sub-totales			
	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.				
de 14	0	0	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	5	6	6
15 a 24	3	3	5	7	0	1	2	2	0	2	0	0	10	15	25	25
25 a 34	2	8	14	16	1	2	0	1	0	0	0	1	17	28	45	45
35 a 44	0	6	3	6	1	1	0	0	0	1	1	0	5	14	19	19
45 a 54	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	5	5
de 55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma	5	18	23	34	2	5	3	4	0	3	1	2	34	66	100	100
Totales		23		57		7		7		3		3		100		
%		23		57		7		7		3		3		100		

En el Cuadro No.2 sólo tenemos que agregar a lo dicho para el anterior con respecto a la edad y el sexo, que los procedimientos quirúrgicos efectuados que predominan son las Lobectomías y el porcentaje relativamente alto de neumonectomías.

CUADRO No.3

RESULTADOS POST-OPERATORIOS DE 100 CASOS DE RESECCION PULMONAR POR TUBERCULOSIS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CLINICAS ACTUALES Y EL TIEMPO DE CONFINAMIENTO EN LOS SANATORIALES.

Tiempo	Condiciones Clinicas										Totales	
	Inactivos		Reactivados		Fallecidos		No curados		Sub-totales		%	
	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.
de 6 m.	0	0	0	0	3	2	0	0	3	2	5	5
-12 m.	3	8	2	0	0	0	0	0	5	8	13	13
hasta 2 a.	13	19	0	8	0	0	0	0	13	27	40	40
hasta 3 a.	5	17	0	1	0	1	1	0	6	19	25	25
hasta 4 a.	5	8	0	1	1	0	1	1	7	10	17	17
más de 4 a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma	26	52	2	10	4	3	2	1	34	66	100	100
Totales	78		12		7		3		100			
%	78		12		7		3		100			

En el Cuadro No.3, podemos ver que, comparando con las formas avanzadas que observamos al ingreso, se logró por medio de la cirugía curar un alto porcentaje de pacientes las reactivaciones predominan en nuestros casos de estudio alrededor de los 2 años después de la operación y que las complicaciones fatales en el 70% han sido en una época vecina a la de la operación.

CUADRO No.4

ESTUDIO DEL TIEMPO DE HOSPITALIZACION SANATORIAL DE LOS 100 CASOS ANALIZADOS, RELACIONADO CON EL SEXO

	Hombres	Mujeres , Niños	Total	
- de 6 m.	3	2	0	5
6 a 12 m.	4	5	0	9
1 a 2 a.	12	18	2	32
2 a 3 a.	9	13	2	24
3 a 4 a.	3	11	1	15
de 4 a.	2	12	1	15
Suma	33	61	6	100
Total			100	

Como podemos ver en este cuadro, la mayor parte de los pacientes operados permanecen entre 1 a 3 años en el Sanatorio, factor de gran importancia si nos ponemos a pensar cuanto tratamiento médico recibe el paciente durante este tiempo.

CUADRO No.5

ESTUDIO DE LA BACTERIOLOGIA PREOPERATORIA -
INMEDIATA DE LOS 100 CASOS ANALIZADOS.

POSITIVOS	31
NEGATIVOS	69
TOTAL	100

Vemos aquí que la positividad preoperatoria es relativamente alta y si tomamos en cuenta que todos ellos han estado con tratamiento de antibióticos antituberculosos durante meses e incluso años antes de la operación, dicha positividad puede atribuirse a estados de resistencia del bacilo a las drogas empleadas. Se consideraron en este cuadro, pacientes con bacteriología positiva, aquellos que lo fueron 6 meses antes de la operación.

Caso de una paciente cuya enfermedad se localizó en la base derecha, pero a la toracotomía se hizo necesario efectuar Lobectomías Media e Inferior derechas.

Caso con lesión bronquial residual en lóbulo superior izquierdo, que hizo obligatoria la extirpación del mismo.

VII COMENTARIOS

En este capítulo serán comentados una serie de factores importantes que influyen en la evolución de un caso de Tuberculosis pulmonar que esté siendo tratado sanatorialmente, y, principalmente, los que deberán ser tomados en cuenta para considerar tratamiento quirúrgico de resección. El capítulo será dividido en 2 partes, la correspondiente a Comentarios Generales y la de Comentarios particulares, tratando de analizar en esta segunda parte los factores a que puedan ser atribuidos los casos que no evolucionaron satisfactoriamente al tratamiento quirúrgico de los 100 analizados en este trabajo.

COMENTARIOS GENERALES:

Entre los factores que debemos considerar sobre manera influyentes en la evolución del caso sanatorial de paciente tuberculoso, se destacan: el tiempo de enfermedad, estado clínico y radiológico (sobre todo este último) y el tratamiento médico específico recibido previamente; factores todos relacionados íntimamente y que, dependiendo del momento en que el paciente llegue a solicitar tratamiento profesional, este podrá establecer pronósticos distintos o encaminar su tratamiento por el método más conveniente para cada caso. Mientras más incipiente es una lesión, el pronóstico será más favorable pero, desgraciadamente en nuestro medio estos casos son la excepción.

Hemos visto que el 70 % de los casos analizados

eran casos muy avanzados de Tuberculosis al momento de ingresar al Sanatorio; de los restantes 29 % eran mas moderadas y solo 1 % de forma mínima.

Si tomamos en cuenta que, a la forma evolutiva descrita (radiológicamente hablando) se asocia íntimamente el cuadro clínico general, nos daremos cuenta cuanto se agrava la situación ya que, generalmente se trata de pacientes de nivel socioeconómico bajo que ingresan al Sanatorio en condiciones nutritivas e higiénicas lastimosas. Muchos pacientes, a pesar de conocer su enfermedad, no buscan tratamiento sino hasta cuando se presenta una hemoptisis u otra complicación.

Afortunadamente, muchos de estos casos, sobre todo si son vírgenes de tratamiento específico, se ven evolucionar en forma admirablemente buena con el reposo, la alimentación y la quimioterapia antituberculosa, pero para esto se necesita tiempo y ese tiempo es el peor enemigo del cirujano al tomar una decisión quirúrgica en uno de estos casos, ya que cuando llega a sus manos, el paciente quizá lleve cuando menos 1 a 2 años de tratamiento y como hemos visto ya anteriormente en Casuística hasta 3 a 4 años, tiempo durante el cual el paciente deberá estar tomando sin cesar sus medicamentos específicos y con frecuencia se ha hecho resistente a ellos con el consecuente riesgo de un postoperatorio sin una terapéutica de protección adecuada.

En general, la mayoría de los casos estudiados ingresaron al Sanatorio cuando su enfermedad ya contaba con 6 a 12 meses de evolución y con tratamiento específico ambulatorio previo, muchas veces en forma i-

rregular; además el tratamiento recibido a través de 6 meses a 2 años de tratamiento sanatorial, muchos de ellos con bacteriología reiteradamente positiva, factor que, analizándolo detenidamente no es sino manifestación de ineffectividad de las drogas para negativizar al paciente, aunque los controles in vitro no demuestran dicha resistencia.

Por lo que se concluye que, el médico tisiólogo debe tener un claro concepto de las indicaciones quirúrgicas de nuestros pacientes para evitarnos la tragedia de tener una gran cantidad de casos inoperables, en primer lugar; en segundo término, los que llegan a la cirugía son casos avanzados, complicados y difíciles.

La cirugía tisiológica, pese a los malos casos en los cuales ha tenido que ser efectuada, demuestra que la bondad de su indicación no debe despreciarse. Queremos que este trabajo no solo despierte en el especialista la indicación de la cirugía sino que también extender este despertar en el médico general que también debe saber tratar correctamente la Tuberculosis ya que, como está demostrado ampliamente, en nuestro medio es la tisiocirugía la que cuenta con el mayor número de enfermos tuberculosos curados.

COMENTARIOS PARTICULARES:

Caso No. 8: FALLECIDA

Paciente con enfermedad de larga duración (años preoperatoriamente), saturada de antibióticos específicos, posiblemente resistente a los mismos. El acto operatorio se dificulta debido a la gran cantidad de adherencias, que obligan a hacer disección extrapleural procedimiento shockeante, que hace bajar la presión arterial, lo que obliga al cirujano a actuar con premura y como consecuencia se abre una cavidad, derramándose su contenido, lo que probablemente infectó el espacio pleural residual constituyéndose postoperatoriamente una fístula broncopleurocutánea. No se pudo completar el tratamiento quirúrgico de la fístula ya que no se contaba con tubo de Carlens que era considerado por nosotros indispensable para este tipo de operación, en base a experiencias previas, ya que hubo reactivación contralateral con caverna grande en LSI que al final provocó una hemoptisis fulminante y la muerte de la enferma por hemorragia aguda.

Caso No. 9: FALLECIDO

Caso difícil, con enfermedad antigua, saturado de antibióticos.

La incisión quirúrgica efectuada seguramente dificulta la visibilidad y accesibilidad a los lóbulos inferiores, ya que se entró al tórax por el 3er. espacio intercostal, que motivó acto operatorio difícil, con disección del hilio complicada, donde se produjo hemo-

gia por herida de vasos, no pudiendo llevar a cabo el procedimiento quirúrgico planeado; solo se pudo extirpar LSD dejando el LMD donde existían lesiones evidentes a los rayos X. Consecutivamente se complicó con fístula broncopleurocutánea que causó la muerte por Insuficiencia Respiratoria a los 7 días de la operación.

Caso No. 15: FALLECIDO

Paciente con enfermedad de larga evolución, sin tratamiento específico previo abundante. El acto operatorio transcurrió como habitualmente. Postoperatoriamente hizo fístula broncopleurocutánea; pese a la misma logró un 50 % de reexpansión de su pulmón remanente, se adaptó a su déficit respiratorio y se fugó del Sanatorio antes de completar tratamiento cuando ya había evidencia de diseminación contralateral que lo llevó a la muerte 2 años más tarde por hemoptisis incoercible.

Caso No. 17: REACTIVADA

Paciente con enfermedad antigua, aparentemente solo en el lado izquierdo, también tuvo mucho tiempo de tratamiento específico ambulatorio. Sufrió Lobectomía previa y luego Lobectomía superior izquierda, la que hasta la fecha ha actuado bien inactivando las lesiones izquierdas pero, el medio ambiente al que regresó la enferma (doméstica del Sanatorio), favoreció el desarrollo de enfermedad circunscrita en el lado derecho que ameritará cirugía.

Caso No. 22: FALLECIDA

Paciente con Tuberculosis pulmonar muy avanzada en pulmón derecho con evolución larga e igual tratamiento médico, que ameritó de varias intervenciones, iniciándose por una toracoplastia derecha en virtud de lesiones antiguas cicatriciales el pulmón contralateral que pudieran haberse reactivado postoperatoriamente. Durante la 2a. intervención: Neumectomía derecha bajo toracoplastia, la paciente presentó manifestaciones alérgicas al paso de la sangre; a partir de entonces estuvo hipotensa, luego, postoperatoriamente la Presión arterial presentó oscilaciones que, al final, condujeron a la paciente a la muerte 4 horas más tarde. Creemos que fué debida a problemas de compatibilidad sanguínea, aunque para ello, desgraciadamente no dispongamos más que del criterio clínico ya que no se efectuó, aparentemente, la necropsia que procedía efectuar en un caso como el presente.

Caso No. 24: REACTIVADA

Paciente con enfermedad moderada en vértice izquierdo, saturada de drogas antituberculosas antes de ingresar al Sanatorio. El procedimiento quirúrgico fué difícil, tanto por la gran cantidad de adherencias que producen mucha hemorragia como por el hallazgo de anomalías anatómicas que dificultan la disección. Se efectuó Resección segmental habiendo tenido que dejar cuerpo extraño (Gelfoam), para cohibir hemorragia, factores contribuyentes para que se produjera fístula incarcerada que, mientras estuvo en el Sanatorio no dió muestras de actividad, por lo que no se dispuso hacer o

tro procedimiento quirúrgico. A los 2 años postoperatorios, existe lesión basal de reactivación en el lado operado, consecutiva, no hay duda, al problema que constituye su fístula incarcerada y que ameritará tratamiento quirúrgico ulterior.

Caso No. 33: NO CURADA

Pacientes con 8 años de enfermedad, al principio bilateral, posteriormente se localizó en pulmón izquierdo y pese al tratamiento prolongado con antibióticos específicos no se logró curación satisfactoria de las lesiones por lo que fué sometida a intervención quirúrgica de resección complementada con toracoplastia osteoplástica para evitar reactivación de lesiones evidentes que el cirujano deja en el lóbulo remanente, pero que a su juicio no justificaban la Neumectomía, además de desear con ello evitar desviación mediastinal que favorecería la reactivación de lesiones antiguas en pulmón contralateral. Durante el acto operatorio las anomalías anatómicas encontradas dificultan la operación y, factor importante en nuestro medio, al final de la operación no se pleuralizó el muñón bronquial, razón ésta última que creemos es la causa de las complicaciones referidas en la descripción del caso.

Caso No. 37: FALLECIDA

Pacientes con enfermedad antigua. Operación difícil por las adherencias fuertes a planos superficiales que se habían desarrollado, neocirculación en planos pleurales, que se vió estimulada y agravada por la toracoplastia previa, la cual había logrado un conside-

rable y efectivo colapso de las lesiones principales. Durante el acto operatorio estas adherencias sangraron abundantemente, así como también la distorsión producida por la misma enfermedad y la cirugía previa motivaron la circunstancia de que el anestesista intubara el bronquio derecho, lo que se comprobó en el acto operatorio cuando la paciente entró en shock y cianosis por Insuficiencia respiratoria y circulatoria, estado que mejoró con la terapéutica intuida contra el colapso vascular y al ser retirado el tubo hasta la altura de la tráquea. No se logró controlar eficazmente el sangramiento, lo que ocasionó la muerte por Anemia aguda postoperatoria. Tenemos la impresión de que fué un caso mal evaluado con vistas a la 2a. intervención, que debió haberse orientado a completar la toracoplastia, que tan buen resultado había logrado en su 1er. tiempo, en lugar de la laboriosa y difícil lobectomía que fué, a la postre, la que llevó a la enferma a la muerte por sangramiento intenso postoperatorio.

Caso No. 45: REACTIVADA

Pacientes con enfermedad antigua, saturada de antibióticos, sin resolución definitiva de sus lesiones, por lo que se hace necesario efectuar lobectomía superior izquierda; la operación es difícil debido a la presencia de anomalías anatómicas y a la gran cantidad de adherencias que, incluso han llegado a producir fusión de la cisura interlobar, que es necesario hacerla artificialmente mediante corte entre pinzas; el parénquima se encuentra muy enfermo y además hay enfermedad ganglionar muy manifiesta que no es posible extirpar, dejando las linfoglándulas enfermas, factor que sumado a

otros de índole social del ambiente a que llegó la paciente al egresar, creemos sean los causantes de la reactivación.

Caso No. 49: REACTIVADA

Paciente con Tuberculosis de larga data que prácticamente destruye el Lóbulo superior derecho, desvía mediastino al lado contralateral, lesiones residuales en lóbulo superior izquierdo y además del prolongado tratamiento médico específico se hace necesario someterla a doble intervención quirúrgica: Lobectomía superior izquierda y Toracoplastia, pero los hallazgos operatorios obliga además a efectuar Segmentectomía superior del lóbulo inferior; hace una fístula broncopleurocutánea en postoperatorio inmediato, se observa durante 6 meses en el hospital y se dá egreso. A los 2 años reingresa con bacteriología positiva y la fístula reabierta. El caso es el de una fístula encarcerada no curada, con reactivación de las lesiones tuberculosas.

Caso No. 53: NO CURADO

Paciente con enfermedad antigua y tratamiento médico abundante quien fue intervenido por bronquiectasia y atelectasia con la indicación de efectuar Lobectomía superior derecha. En el curso de la operación y como consecuencia de las adherencias extensas y firmes se rompió accidentalmente una cavidad que no era evidente a los rayos X, lo cual obligó a efectuar Segmentectomía superior del lóbulo inferior. En los primeros días del post-operatorio aparece fístula broncopleurocutánea

nea y, en un intento por curar la misma, se hace necesaria una Toracoplastia derecha, sin resultado favorable ya que la fistula persiste hasta la fecha, hay infiltrado de reactivación en pulmón contralateral y el paciente ha salido del sanatorio.

Caso No.58: REACTIVADA.

Paciente con enfermedad de 2 años de evolución tratamiento médico al momento de la operación, con lesiones localizadas en lóbulo superior izquierdo que ameritan Lobectomia, la cual se lleva a cabo. Acto operatorio difícil, que se complica más al herir accidentalmente la arteria pulmonar, la cual hay que suturar previa compresión intrapericárdica de la misma. Se reseca cuña lesión nodular múltiple en segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. Dos años más tarde regresa Sanatorio con imagen de cavidad en la porción restante del segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. Caso característico de lesiones residuales a distensión postoperatoria que se reactiva.

Caso No.63: REACTIVADO

Paciente con enfermedad antigua, saturado de antibióticos que durante la intervención es necesario liberar adherencias extensas, lo cual trae como consecuencia que se abra una caverna derramando su contenido en la cavidad pleural, formándose postoperatoriamente una fistula broncopleural incarcerationada, que se observa y controla en el Sanatorio durante 4 meses y al final es dado de alta como inactivo. A los 9 meses reingresa al Hos-

pital con reaparición de la fistula, bacteriología positiva y cavidad en campo medio derecho.

Caso No.64: FALLECIDO.

Paciente con enfermedad extensa derecha y desviación mediastinal haciendo enfisema compensatorio del lado operado, donde hay lesiones cicatriciales antiguas, Tuberculosis antigua y tratamiento médico durante largo tiempo, resistencias in vitro a la DHE. Se hace necesaria Neumectomia derecha, procedimiento que fue difícil, con sangramiento profuso, hipotensión prolongada durante la operación, la cual no se lleva a cabo en forma satisfactoria ya que el cirujano en su nota operatoria aclara que deja muñón bronquial muy largo, pero que las condiciones del paciente impiden hacerlo de otra manera. Durante el acto operatorio y el postoperatorio inmediato el paciente permanece hipotenso y disneico y muere a las 4 horas después de la operación por Insuficiencia Cardiocirculatoria motivada por sangramiento profuso sumado al enfisema compensatorio contralateral.

Caso No.70: FALLECIDO

Paciente con evolución de 5 años de enfermedad, resistente a los antibióticos específicos, muy probablemente contaminado con báculo ya resistente que, pese al tratamiento médico variado y prolongado persiste con bacteriología positiva y principia a tener hemoptisis incoercibles, que no ceden con los medios terapéuticos habituales. Se dispone como último recurso, efectuar u-

na Neumectomía para tratar de salvarlo, riesgo operario muy grave que se comprueba al solo hacer la toracotomía ya que entra en paro cardíaco del cual se le saca para proseguir una operación que ya no se finalizó porque el paciente muere en la mesa de operaciones al reinstalar el paro cardíaco.

Caso No.79: REACTIVADA.

Paciente con cuatro años de evolución de enfermedad y tratamiento médico específico, con irregular distribución de sus lesiones que, por esta circunstancia, amerita tratamiento de excéresis izquierda sacrificándose mucho tejido sano. Paciente sale del hospital a un medio socioeconómico sumamente precario agravado con problemas afectivos profundos que, no hay duda, la hicieron considerar el estado de su enfermedad como problema al cual no le dió debida importancia, desmejora en su estado general la bacteriología se vuelve positiva con pocas sombras radiográficas, de tipo diseminativo. Regresa al Sanatorio donde continúa con tratamiento médico con la consiguiente mejoría del cuadro general y desaparición de las sombras radiológicas.

Caso No.88 : REACTIVADA

Paciente con tuberculosis pulmonar localizada en lóbulo superior izquierdo, después de tratamiento médico específico durante un año. El procedimiento quirúrgico es difícil debido a las abundantes y fuertes adherencias, enfermedad ganglionar manifiesta que no es posible reseñar y anomalías anatómicas de las arterias al lóbulo supe-

rior izquierdo. Es dada de alta por inactiva a los 3 meses de la operación y reingresa al año y tres meses de operada con imagen de caverna en el pulmón izquierdo permanente, comprobada por examen tomográfico. La bacteriología también fue positiva a su reingreso. Creemos que la reactivación puede atribuirse a la amplia enfermedad ganglionar existente y que no pudo ser resecada y a probables problemas de reexpansión.

Caso No.89: REACTIVADA

Paciente de edad avanzada, lesiones antiguas y tratamiento antituberculoso en grandes cantidades; la presencia de una cavidad en el vértice pulmonar derecho obliga a intervenir y al hacerlo, la presencia de la caverna en forma aislada y el estado del resto del pulmón sugieren el camino a seguir, efectuándose resección segmental apical y posterior derecha, operación difícil de llevar a cabo debido a las adherencias encontradas. Intencionalmente, es necesario dejar lesiones evidentes, pero no queda otro recurso. La paciente es dada de alta con radiografía donde se evidencia claramente la presencia de falta de reexpansión del pulmón remanente, con el consiguiente espacio vacío residual. La paciente regresa al Sanatorio al año 9 meses más tarde con hemoptisis y evidencia radiológica de reactivación. Creemos que la evaluación del caso previo a su egreso fue mal encaminada, ya que se debió haber indicado una toracoplastia que completara el tratamiento que, hasta el momento se encontraba cumpliendo su cometido en forma satisfactoria.

Caso No.90: REACTIVADA

Paciente con enfermedad de varios años de evolución y tratamiento médico antituberculoso, que persistió bacteriología positiva hasta que fue operada. La operación fue muy laboriosa pero, transcurrió como habitualmente. Quedo espacio residual que ameritó efectuar Toracoplastia post-Lobectomia superior derecha. Unos meses más tarde reingresa con esputos hemoptoicos, bacteriología positiva (que cedió con el tratamiento médico sanatorial) además de imágenes radiológicas de reacción por debajo de la Toracoplastia.

Caso No.91: REACTIVADA

Paciente con enfermedad moderada al principio bilateral. Su bacteriología sólo fue positiva en una oportunidad en el Sanatorio; Tratada médicamente, pero después de mucho tiempo y tratamiento abundante queda imagen de cavidad parahiliar que amerita intervención quirúrgica. Al principio fue planeada una lingulectomia, pero en el momento de la operación, la gran cantidad de adherencias muy vascularizadas, enfermedad ganglionar grave y las dificultades para la disección vienen a terminar de complicarse cuando se rasga accidentalmente la arteria pulmonar, con sutura de la brecha que se dificulta debido a la situación de la herida arterial, la paciente se pone hipotensa debido al sangramiento; como último recurso para salvar la vida a la paciente se decide hacer una Nectomia izquierda, con lo cual se solucionó de momento la situación, la cual se prolongó durante cerca de 2 años cuando la paciente desmejora en su estado general, la bacteriología se torna positiva, por lo que reingresa por

ser tratada médicamente con lo cual mejora el estado clínico y bacteriológico, sin que, hasta la fecha haya habido ningún cambio radiológico de actividad manifiesta.

Caso No.92: NO CURADO

Enfermedad grave, saturada de antibiótico, con lesiones extensas en el lado no operado, resistente a los antibióticos. Pese a los buenos controles y estudio preoperatorio, se hace mala indicación quirúrgica. La operación se dificulta, primero por la mala visión ya que el abordaje quirúrgico nos parece fue inadecuado, y segundo por la extensión de la enfermedad que imposibilita hacer una buena sutura bronquial, la cual se tuvo que hacer en bloque, motivo principal que influyó en la aparición de fístula broncopleurocutánea que ameritó Toracoplastia ulterior, pero que aún no ha resuelto el problema del paciente.

Caso No.100: REACTIVADA.

Paciente con enfermedad antigua y tratamiento abundante, posiblemente con resistencia a las drogas antituberculosas; hace una caverna gigante en lóbulo superior izquierdo, que en el acto operatorio imposibilita un buen abordaje hacia el bronquio, del cual se deja al final un muñon muy largo, el que es necesario volver a diseccionar más profundamente para hacer un segundo cierre, todo lo cual influyó posiblemente para dejar enfermedad a nivel de este bronquio, que fue posiblemente la fuente de origen de la reactivación.

VIII

CONCLUSIONES

1. La cirugía de resección pulmonar como tratamiento complementario de la tuberculosis continúa siendo de gran utilidad; es, hasta la fecha, uno de los procedimientos que en mayor porcentaje contribuyen a la curación de los casos a ella encomendados y el método que elimina en su mayor parte el foco de infección, contribuyendo a la disminución de la incidencia de nuevos casos.
2. Se estudiaron 100 casos de pacientes a quienes fue efectuada cirugía de resección pulmonar, lográndose concluir en:
 - a. 70% de ellos presentaban a su ingreso una forma avanzada de TBC pulmonar, 29% de formas moderadas y sólo 1% de forma mínima. De dichos 100 casos, 66 pertenecen al sexo femenino y 34 al sexo masculino, cifras que incluyen 6 niños (menores de 14 años). Podemos ver un predominio en las formas avanzadas de enfermedad y predominio del sexo femenino sobre el masculino, esto es probablemente explicable por la existencia en el Sanatorio de mayor cantidad de camas en la sección de mujeres.

- b. El tipo de intervención quirúrgica más empleado fue la Lobectomía única en el 57% de ellos; Neumectomía en 23% de ellos lo que ilustra hasta que punto llegan a localizarse en un solo lóbulo las lesiones que originalmente existían con predominio bilateral como se vio en el inciso anterior, lo cual se logra con el tratamiento médico específico por tiempo variable. Nótese asimismo la relación existente entre el avance de las lesiones y la frecuencia de los casos en que hubo necesidad de extirpar un pulmón completo.
- c. Con respecto a la edad a que fueron operados el 90% estaban comprendidos entre los 15 y 44 años, lo cual sólo viene a corroborar la teoría mantenida durante mucho tiempo, de considerarse a la TBC como enfermedad de la edad adulta de la vida.
3. Los resultados obtenidos en los casos operados, después de un período de control de 6 meses a 4 años fueron los siguientes:
- a. En 78% hay Inactividad clínica, radiológica y bacteriológica; casos que podemos considerar hasta la fecha como curados, gracias a la combinación de los tratamientos médico y quirúrgico.
- b. El 22% restante, que podríamos considerar, como fracaso del tratamiento quirúrgico, se repite en la forma siguiente:

Reactivaciones	12%
Fallecimientos	7%
No curados	3%

4. Analizando detenida e individualmente cada uno de los casos en que la cirugía no obtuvo el éxito deseado, se concluyó en lo siguiente:
- a. Insistir en una buena evaluación preoperatoria de cada caso evitando así efectuar intervenciones mal indicadas o poco apropiadas para el paciente y tomando en cuenta todos los factores mencionados en el capítulo sobre la selección del paciente. Se menciona en Comentarios (Caso No.37) el caso de una paciente que posiblemente no hubiera fallecido si hubiera sido mejor evaluada antes de la intervención.
- b. Entre los factores de técnica, el abordaje quirúrgico inadecuado de la lesión a reseca, puede dificultar el procedimiento y obligar a efectuar maniobras que ponen en peligro la efectividad del mismo. Una incisión muy pequeña, en casos de resección pulmonar por TBC, dificulta la liberación de adherencias que se encuentran en la mayor parte de los casos, durante la toracotomía y obliga a dejar, en ocasiones, lesiones que no pudieron ser evidenciadas por la exploración, debido a la escasez de espacio. La disección cuidadosa de las adherencias y una minuciosa hemostasis, son de gran importancia para disminuir la incidencia de los fracasos de la cirugía.

- c. La detenida evaluación post-operatoria previa al egreso del paciente, es imprescindible para llevar a cabo cualquier procedimiento adicional si fuera necesario, evitando así, lo posible, que a largo plazo sobrevengan complicaciones que lleguen a constituir un fracaso del procedimiento, como por ejemplo los problemas de espacio residual.

Br. Juan Rafael Minera de León

Dr. Julio César Mérida
Asesor

Dr. Alfredo Barrascout M.
Revisor

Vº. Bº.

Imprímase:

Dr. Carlos A. Soto
Secretario

Dr. Carlos Manuel Mónico
Decano

BIBLIOGRAFIA

1. Archivos del Sanatorio Antituberculoso San Vicente, correspondientes a los años 1959 a 1963.
2. Archivos del Servicio de Rayos X del Sanatorio Antituberculoso San Vicente.
3. Acevedo, Marco Antonio, Tratamiento Quirúrgico de la Tuberculosis pulmonar en el niño. Tesis de investidura. Nov. 1963.
4. Anson, Barry. An atlas of Human Anatomy. Saunders Co. 1963.
5. Burch and Miller. Surgical Diseases of the Lung. - Charles Thomas Publisher. Illinois, U.S.A. 1963.
6. Chicas R., Mario. Importancia de la Broncografía en el Diagnóstico y Tratamiento de las enfermedades Broncopulmonares. Tesis de investidura. Junio 1954.
7. Domarus, A. v., Ferreras, P.: Compendio de Patología Médica. Editorial Marín. España, 1964.
8. Gómez Pimiento, J. Luis: Acerca del tratamiento de la Tuberculosis pulmonar. Boletín del Instituto Nacional de Neumología de México.
9. Heaf, F.R.: Symposium of Tuberculosis. Casell y Cia London. 1957.
10. Hinshaw; H. Corwin; Garland, L. Henry: Enfermedades del Tórax. Editorial Interamericana, 1957.
11. Johnson, Julian; Kirby, Charles; Cirugía Torácica. Editorial Interamericana S.A. México, 1954.
12. Llerena Veliz, Rodolfo: Resultados del tratamiento quirúrgico de la Tuberculosis pulmonar. Tesis de investidura. Noviembre 1959.
13. Méndez, Pedro Horacio: Evaluación de 100 casos de tuberculosis pulmonar tratados en el Sanatorio-

- Antituberculoso San Vicente. Tesis de Investidura .
Julio 1963.
- Rubin, Eli; Rubin Morris: Thoracic Diseases. W.B. -
Saunders Co. 1961.
- Storey, Patrick B.; Kieffer Jr.; Rochard F.: Enfer-
medades pulmonares importantes. Clínicas Médicas
de N. A., Enero 1959. Editorial Interamericana.
- Conclusiones y recomendaciones del tema "Indica-
ciones de Toracoplastia". VI Congreso Panamerica-
no de Fisiología efectuado en Bolivia 1964.
- Wylle, R. and Bowman, F.: Immediate complica-
tions following Thoracotomy for pulmonary diseases.
The surgical clinics of N.A. Vol. 44 No.2, April-
1964. Saunders.
- Rigler, L.G.: The Chest, a Handbook of Roentgen-
diagnosis. 2nd. edition. Year book publisher. -
Chicago, 1956.