UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA PINZA
MESENTERICA

TESIS

Presentada a la Junta Directiva de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos
de Guatemala

por

JOSE ALBERTO PLEITEZ Y PLEITEZ

en el acto de su investidura de:

MEDICO Y CIRUJANO

-oOo-

Guatemala, Enero de 1965 .-

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA PINZA
MESENTERICA

INDICE

Página

facio

CCION PRIMERA:	1
título I <u>Introducción</u>	1
título II <u>Antecedentes históricos</u>	3
1. <u>Antecedentes internacio</u> nales	3
2. Antecedentes nacionales	4
título III <u>Objetivos</u>	5
1. Anatomía del duodeno	6
2. Anatomía de la arteria me séntérica superior	13
título IV <u>Consideraciones clínicas</u>	15
1. Definición	15
2. Frecuencia	15
a) Sexo	16
b) Edad	16
c) Tipo constitucional	16
d) Herencia	16
3. Etiología	17
4. Patogenia	17
5. Anatomía Patológica	21
6. Sintomatología	21
7. Exámenes	25
a) Examen físico	25
b) Exámenes complemen- tarios	26

	Página
8. Diagnóstico	32
a) Diagnóstico específico	32
b) Diagnóstico diferencial	32
9. Relación con otras enfermedades concomitantes	33
10. Tratamiento	35
a) Tratamiento médico	35
b) Tratamiento quirúrgico	37
11. Pronóstico	39

ACION SEGUNDA:

tulo V.	<u>Material y Método</u>	41
tulo VI	<u>Resultados</u>	43
tulo VII	<u>Discusión</u>	67
tulo VIII	<u>Conclusiones</u>	69
tulo IX	<u>Sumario</u>	71
tulo X	<u>Apéndice</u>	73
	<u>Bibliografía</u>	83

-oOo-

CAPITULO I

INTRODUCCION

Con la denominación de "Pinza Mesentérica" - se refiere a la obstrucción intermitente del duodeno - causada por la presión de los vasos mesentéricos superiores. Este es el término más difundido en nuestro medio, aunque internacionalmente se le conoce con la denominación general de "obstrucción duodenal por la arteria mesentérica".

La "Pinza Mesentérica" como entidad es rara, por lo que al abordar este tema lo hago con el conocimiento de las polémicas que pueden presentarse.

En la sección primera de este trabajo se exponen los elementos básicos para su diagnóstico y tratamiento, así como deducción de su pronóstico y complicaciones.

En la sección segunda se analiza a los enfermos, se insertan reproducciones radiográficas, así como fotografía de un acto quirúrgico, con lo cual se demuestra la existencia de este síndrome.

Finalmente se analizan los resultados, se discuten los mismos, se establecen conclusiones y se anota - el sumario, apéndice y bibliografía del tema.

CAPITULO II

ANTECEDENTES HISTORICOS

A) Antecedentes Internacionales:

En 1849, von Rokitansky describe este síndrome al emitir la idea de que los vasos mesentéricos superiores podían comprimir al duodeno, lo cual secundariamente produciría dilatación y estasis duodenal.

En 1889, Glenard, consideró que la obstrucción parcial del duodeno por los vasos mesentéricos era fisiológica y que tenía por objeto proporcionar tiempo para que se efectuara la mezcla del quimo con los jugos intestinales.

En 1891, Albrecht describió el primer caso clínico.

En 1907, Bloodgood propone la Duodenoyeyunostomía como tratamiento.

En 1908, Stavely acepta la propuesta de Bloodgood y practica la primera duodenoyeyunostomía.

En 1921, Wilkie, describió el cuadro clínico, y delineó su tratamiento, por lo que algunos autores llaman a este cuadro Enfermedad de Wilkie. Debe mencionarse que en la literatura médica revisada no se encuentra ningún caso reportado por algún país de habla española. Como resultado de dichos reportes actualmente se acepta como entidad clínica; y es más, se está de acuerdo con la explicación fisiopatológica refe

rida por Wilkie en 1921. (Darling 1923; Bocku 1944; Licht, 1956; Rosenberg and Sampson, 1957; Strong, 1958).

B) Antecedentes Nacionales:

En nuestro medio hasta el momento no existía ninguna publicación científica respecto a este tema. Con el objeto de rendir honor a quien honor merece, consulté a todos los especialistas que directamente se relacionan con la patología abdominal (Internistas, Radiólogos, Cirujanos, Gastroenterólogos) llegando a la conclusión que el primer diagnóstico de compresión duodenal por los vasos mesentéricos fue hecho el 26 de septiembre de 1961 por el Dr. Adolfo García Padilla, confirmado en la mesa de operaciones el 28 de octubre de 1961 por el Dr. Rodolfo Solís Gel, quien a su vez tiene también el mérito de haber efectuado la primera duodenoyeyunostomía con buenos resultados en el tratamiento de este síndrome.

A partir de entonces otros pacientes con la misma patología han sido descubiertos, tanto en el diagnóstico radiológico como en la mesa de operaciones.

CAPITULO III

OBJETIVOS

Pueden resumirse los objetivos del presente -
trabajo de la siguiente manera:

1. - Difundir el conocimiento de la existencia de es
te síndrome en nuestro medio.
2. - Estudiar el cuadro clínico de nuestros pacientes
y evaluar la terapéutica empleada en los mis-
mos.
3. - Comparar los hallazgos clínicos comunes y no -
comunes en nuestros pacientes con los descritos
por otros autores.
4. - Estimular la investigación de esta entidad.
5. - Establecer normas terapéuticas y sugerir la con-
ducta a seguir en los casos complicados.

Para cumplir con los objetivos y favorecer la
compresión de este síndrome, he considerado convenien-
te previo al estudio de nuestros pacientes, hacer una -
descripción del mismo, incluyendo la anatomía de los
órganos que intervienen en su producción.

Así en el correr del tiempo y del afán de in-
vestigación científica nuevos procedimientos y nuevas
mentes han modificado muchos temas médicos, sin em-
bargo existen principios básicos que a través de los a-
ños han perdurado y el que a continuación se describe
es uno de ellos.

1.- Anatomía del Duodeno

Fig. 1

1, aorta.—2, vena cava.—3, vena porta.—4, conducto hepatocólico.—5, tronco celiac superior.—6, arteria hepática verdadera.—7, arteria gastroduodenal.—8, arteria pancreatocoduodenal inferior.—9, arteria pancreatocoduodenal superior.—10, arteria mesentérica superior.—11, arteria mesentérica inferior.—12, arteria pancreatocoduodenal izquierda.—13, arteria pancreatocoduodenal derecha.

1. - Anatomía del Duodeno

El duodeno es el segmento del intestino delgado que se extiende desde el píloro hasta el principio del yeyuno en el ángulo duodenoyeyunal.

Está situado en la parte posterior y superior de la cavidad abdominal. A partir del píloro, se dirige hacia arriba, atrás y a la derecha, hasta nivel del cuello de la vesícula biliar, en donde se detiene y cambiando por el borde externo de la cabeza del páncreas hasta su extremidad inferior de donde se dirige de derecha a izquierda hasta la parte media de la columna vertebral; aquí cambia otra vez de dirección y continúa hacia arriba y a la izquierda hasta llegar a la cara lateral izquierda de la segunda vértebra lumbar, donde termina, formando el ángulo duodenoyeyunal.

El duodeno mide de veinte a treinta centímetros de longitud y su anchura es de 3 a 5 centímetros. Representa los cuatro quintos de un círculo que rodea la cabeza del páncreas. Cada uno de los cuatro cuadrantes recibe el nombre de porción, lo cual facilita su descripción.

La porción superior o primera porción llamada por los radiólogos bulbo duodenal, tiene cinco centímetros de longitud; es oblícua hacia arriba, atrás y a la derecha, situada entre el píloro y el cuello de la vesícula biliar. Esta región es importante para el clínico por ser la localización más frecuente de la úlcera péptica.

La segunda porción o porción descendente, se extiende del cuello de la vesícula biliar a la parte inferior de la cabeza del páncreas. En su pared penetran el colédoco y el conducto de Wirsung formando la ampolla de Vater a diez centímetros por debajo del píloro.

El conducto pancreático accesorio o de Santorini, se abre en la misma pared a 1-3,5 centímetros por arriba de la ampolla de Vater.

La tercera porción o porción transversa del duodeno, se dirige hacia la izquierda, pasando la línea media a nivel de la tercera vértebra lumbar y formando una ligera concavidad dirigida hacia arriba. Está cubierta de peritoneo, excepto en el lugar donde contacta con los vasos mesentéricos superiores y la raíz del mesenterio del intestino delgado.

Este segmento descansa sobre la aorta, vena cava inferior y las vértebras. Se relaciona pues por delante con el peritoneo y con la mesentérica superior y por intermedio de ellos se pone en contacto con las asas del intestino delgado. Hacia atrás está relacionada con el psoas, con la vena cava inferior. Por arriba se relaciona directamente con el borde inferior de la cabeza del páncreas y por abajo con las asas del intestino delgado. Está cubierta en su cara anterior por la hoja parietal del peritoneo, que se continúa hacia arriba cubriendo los vasos mesentéricos superiores y la parte de la cabeza del páncreas; por abajo y a la izquierda ésta cara está cubierta por la hoja derecha del mesenterio.

La lordosis y la visceroptosis tienden a estre-
 nar el lecho entre las vértebras, por detrás, y el me-
 ntario con sus grandes vasos por delante, lo cual pue-
 ocasionar cierto grado de compresión de la porción
 transversa del duodeno cuando la persona se halla en
 posición supina o en bipedestación.

2: Compresión de la porción transversa del duodeno por la
 pinza arterial en bipedestación.

Cuando la compresión es severa, provoca es-
 tasis duodenal, recibiendo el nombre de oclusión arte-
 riosintomática del duodeno, que es el tema de nuestro
 estudio. Ver Figura 3.

Fig.3

La cuarta porción o porción ascendente del duodeno, después de cruzar las vértebras ocupa el lado izquierdo de la aorta, sube aproximadamente dos centímetros y medio hasta el nivel de la segunda vértebra lumbar, después se torna hacia adelante y abajo para unirse al yeyuno.

En bipedestación y posición erguida el ángulo duodenoeyunal es agudo y en las personas ptósicas, debido a la tracción del mesenterio del intestino delgado, puede producir estasis duodenal.

En lo que se refiere a su configuración interna; ésta se caracteriza porque es lisa en su primera porción y en la parte superior de la segunda; presentando en el resto repliegues transversales que forman las válvulas conniventes o válvulas de Kerkring cuyo papel fisiológico consiste en aumentar la superficie de absorción del intestino.

También pertenece a su interior: a) las carúnculas mayor y menor, situadas en la segunda porción donde desembocan el conducto colédoco y conducto de Wirsung en la primera y el conducto de Santorini en la segunda respectivamente; b) vellosidades intestinales, que por su número y proximidad le dan a la mucosa un carácter aterciopelado; c) Glándulas de Brunner y Lieberkühn; y d) formaciones linfoides.

Los dos últimos elementos ocupan los espacios que separan a las vellosidades intestinales.

En lo que se refiere a su constitución anatómica el duodeno está compuesto por una túnica serosa, otra muscular, una tercera submucosa y otra mucosa. La tú

nica serosa se relaciona estrechamente con el peritoneo y dichas relaciones ya fueron mencionadas.

La túnica muscular está formada por dos planos, uno superficial de fibras longitudinales y otro profundo de fibras circulares.

La túnica submucosa está constituida por tejido conjuntivo y fibras elásticas.

Y la túnica mucosa es la que reviste todo el interior, y el cual ya ha sido descrito.

Vasos y Nervios: Su irrigación proviene de las arterias pancreáticas duodenales superior e inferior derechos y de la gastroduodenal y de la pancreatoduodenal izquierda, rama de la mesentérica superior.

De sus capilares se forman venas que van a formar troncos satélites de las arterias que directamente aumentan el caudal sanguíneo de la porción superior. (En la mesentérica superior: pancreática duodenal izquierda y pancreática duodenal derecha inferior; la pancreática duodenal derecha superior, termina en la vena porta).

Los linfáticos van a los ganglios portales situados detrás del páncreas.

Los nervios de la primera porción provienen de las ramas hepáticas, del plexo duodeno pilórico y los nervios de las tres porciones restantes, provienen de los ganglios mesentéricos superiores del plexo solar.

De lo anterior se deduce que el duodeno se mantiene en su posición gracias al peritoneo que lo in-

plica contra la pared posterior del abdómen. También a los conductos excretores del hígado y del páncreas, - al músculo y fascia de Treitz, y finalmente a sus vasos y nervios.

A pesar de ello, en los pacientes con esplacnoptosis acentuada, puede estar colocado al menos dos vértebras por debajo de su localización ordinaria y ser relativamente móvil.

2. - Anatomía de la Arteria Mesentérica Superior

La arteria mesentérica superior nace en la cara anterior de la aorta abdominal, por debajo del tronco celíaco y a nivel del borde superior de la primera vértebra lumbar. Irriga toda la porción del tubo digestivo que proviene del asa intestinal primitiva: intestino delgado, una parte del páncreas, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y la parte derecha del colon transverso y mide aproximadamente veinticinco centímetros en el adulto y su calibre varía en su origen entre seis y doce milímetros, después de lo cual disminuye progresivamente a medida que se aproxima a su terminación.

Después de su nacimiento desciende verticalmente hacia abajo y adelante, estando separadas de la aorta por la vena renal izquierda la cual para llegar a la vena cava cruza transversalmente la cara anterior de la aorta y posterior de la arteria mesentérica pasando por el vértice del ángulo aórtico mesentérico. Por lo cual primero está situado junto a la pared abdominal posterior detrás del páncreas. Después de alcanzar el borde inferior del páncreas y a nivel de su cuello, cruza la cara anterior de la tercera posición del duodeno,

penetra en el mesenterio, desciende por su raíz en un trayecto bastante largo, llega hasta unos ocho centímetros del ángulo íleocecal donde termina en dos ramas; la rama inferior se anastomosa con la última rama intestinal y la rama superior con la rama ileal de la ileocolónica (arteria cólica derecha inferior).

En su trayecto origina muchas ramas colaterales, siendo ellas las siguientes: El ramo hepático de la mesentérica superior, la arteria pancreática inferior izquierda de Testut; la arteria pancreatoduodenal inferior; las arterias intestinales y las arterias cólicas derechas.

Al desprenderse de la aorta abdominal y seguir el trayecto ya descrito forma un ángulo abierto hacia abajo y al cruzar verticalmente a la cara anterior de la tercera porción del duodeno, en su parte media, marca una impresión en el intestino, que puede ser de profundidad variable (ver figura # 3). Esa marca más o menos profunda es la causante del síndrome que estudiamos cuyo mecanismo explicaremos más adelante.

CAPITULO IV

CONSIDERACIONES CLINICAS

1. Definición

La Pinza Mesentérica consiste en un estado patológico caracterizado por el retardo intermitente en el tránsito del contenido duodenal a través de su porción transversa, debido a la compresión de la tercera porción del duodeno en su cara anterior, por la raíz del mesenterio del intestino delgado que contiene la arteria, vena y nervio mesentéricos superiores (paquete vasculo-nervioso mesentérico superior) y en su cara posterior - por la aorta y la columna vertebral.

2. Frecuencia

Hasta el momento no ha sido posible establecer el índice de frecuencia general. Factores no intencionales se oponen a dicho objetivo. Entre ellos puede mencionarse en primer lugar a las múltiples sinonimias del síndrome, lo cual confunde a los archivos hospitalarios; y en segundo lugar a los pocos autores que se han preocupado en su investigación.

Se considera relativamente rara, sin embargo - puede ser mas alta su frecuencia que lo corrientemente reportado. En febrero de 1953, Goin y Wilk en el Hospital "Queen of Angels" después de cuidadosa investigación en 1500 series gastrointestinales altas, reportó radiológicamente la existencia de lesiones gastrointestinales en más o menos el 30% y la existencia de 5 casos de obstrucción arteriomesentérica del duodeno.

En 1954, una investigación similar en 580 series gastrointestinales altas hecha por Residentes de Radiología en Harbor General Hospital, Torrance, reportó alteraciones gastroduodenales en el 36% y 2 casos de obstrucción arteriomesentérica del duodeno.

Ambas investigaciones reportan la existencia de 1 caso radiológico de obstrucción arteriomesentérica del duodeno en 300 series gastroduodenales.

Mckinnon y Spencer en 1963 operaron 8 casos ocurridos, en 8904 series gastrointestinales altas por lo cual reportan la existencia de menos de 1 caso quirúrgico en 1000.

- a) Sexo: Todos los autores están de acuerdo, en que su frecuencia es mayor en el sexo femenino, en cualquier edad que se considere.
- b) Edad: La Pinza Mesentérica se presenta con mayor frecuencia en personas de edad media y en la cuarta década de la vida, aunque puede ocurrir en cualquier edad y la literatura médica tiene casos desde la edad neonatal hasta la edad senil. Bockus considera que la edad promedio es alrededor de los cuarenta años.
- c) Tipo constitucional: Desde las primeras descripciones clínicas hasta el momento, lo común es en el tipo asténico, delgado y con visceroptosis.
- d) Herencia: La herencia no parece ejercer ninguna influencia, o al menos no ha sido descrita. No existen estudios para demostrar la tendencia a través de una o más generaciones y nunca se ha reportado la existencia del síndrome de la Pinza Mesentérica en gemelos.

3. Etiología

Se debe a la combinación de condiciones anatómicas y mecánicas alteradas por factores congénitos o adquiridos, o a ambos. Algunos autores aceptan lo anterior como una parte de la etiología del síndrome y la otra parte ellos la consideran formada por factores psicogénicos.

4. Patogenia

Por consiguiente cualquier factor capaz de estrechar el ángulo vascular o reducir el espacio existente entre el paquete vásculonervioso mesentérico superior por delante y el suelo del duodeno comprimido por la aorta y las vértebras por detrás, puede producir obstrucción parcial o completa de la luz duodenal con la consiguiente producción de este síndrome.

En algunas ocasiones el inicio de la sintomatología de la Pinza Mesentérica se ve en la infancia y ocasionalmente en el recién nacido; siendo las responsables, anomalías anatómicas congénitas.

Estas anomalías o factores congénitos pueden agruparse como sigue:

- a) Un mesenterio del intestino delgado corto o excepcionalmente largo.
- b) Explacnoptosis generalizada.
- c) Rotación incompleta del intestino.
- d) Musculatura abdominal defectuosa.
- e) Arteria mesentérica superior aberrante o cualquier posición anómala de sus ramas, más comunmente la arteria cólica derecha o media.
- f) Fusión incompleta de los mesenterios y excesiva mo-

ilidad intestinal, especialmente del colon derecho.

Schermuly observó 10 casos con esta patología en 122 exámenes por dolor abdominal inexplicable.

Cuando la sintomatología de la Pinza Mesentérica aparece después de la infancia, se puede asumir que este síndrome es producido por factores adquiridos que actúan separadamente, o en unos con algunas anomalías congénitas predisponentes. Estos factores adquiridos pueden ser los siguientes:

- a) Una pared abdominal laxa y débil.
- b) Disminución o aumento rápido de la grasa corporal.
- c) Lordosis.
- d) Tracción del mesenterio por estasis ileal y por adherencias pélvicas.
- e) Raíz arteriomesentérica acortada por reacciones inflamatorias o neoplásicas.
- f) Alteración neuromuscular.

Los mecanismos por medio de los cuales los diversos factores favorecen el desarrollo del síndrome de la pinza mesentérica, son variables y obedecen a cada factor.

Mínima presión es suficiente para obstruir el duodeno. Los experimentos de Dragestedt efectuados en perros revelan que la presión equivalente a una columna de agua de seis pulgadas de alto produce una obstrucción letal. Sin embargo la misma presión ocasiona obstrucción, pero sin síntomas si se produce en la parte del yeyuno, ileon o colon.

La constricción puede aumentarse por tracción del mesenterio hacia abajo y si se hace hacia abajo

atrás puede producir una oclusión completa tal como de mostró Albrecht en 1889.

Y es lo que sucede en el aumento de la tensión sobre el mesenterio del intestino delgado, debido a la ptosis del intestino delgado al interior de la pelvis. Ro binson en 1900 después de treinta autopsias recalcó la importancia de este mecanismo.

También Codman mencionó la importancia de la postura erguida en el hombre como factor adicional en el desarrollo de este mecanismo. Comprobó también que este síndrome no es conocido en los cuadrúpedos - porque el mesenterio se dirige ventralmente, no en sen tido caudal como en el ser humano.

Cuando el mesenterio es corto y no descansa en la pelvis o contra la pared abdominal se supone que ha ce más agudo el ángulo duodenoyeyunal, lo cual pre dis pone a la aparición de vólvulo yeyunal intermitente y estasis duodenal.

En los casos de la pared abdominal defectuosa - tales como, cuando es laxa y débil no proporciona sos tén al mesenterio intestinal produciendo ptosis del intes tino delgado. Se observa frecuentemente en casos de bido a obesidad, embarazos sucesivos, vida sedentaria y pérdida de peso.

En los casos de visceroptosis y vasos arteriales aberrantes (arteria cólica derecha o media) hacen que la arteria cólica media se dirija paralelamente a la arteria mesentérica superior, lo cual produce una presión adicional sobre el duodeno. Y cuando esto sucede algunos observadores le llaman oclusión mesentérica de tipo cólico.

La ptosis renal derecha por la tracción que puede ejercer la flexura del colon.

Cuando existe lordosis se reduce en forma considerable el espacio del ángulo vascular, lo cual hace que la porción transversa del duodeno descansa sobre una superficie ligeramente convexa, produciendo además un incremento a la compresión mesentérica. Schnitzler fué el primero en darle importancia a este factor, frecuentemente se observa en pacientes a los cuales se le ha colocado un yeso en hiperextensión torácica o en aquellos pacientes que permanecen en su lecho en posición supina por mucho tiempo. Y sus manifestaciones clínicas se pone en evidencia cuando se les quita el yeso y se levantan, al acomodarse nuevamente a la posición erguida.

La posición baja del colon transverso (a nivel de la cuarta vértebra lumbar) ejerce idéntico mecanismo que la lordosis.

Cuando se produce pérdida o ganancia rápida de la grasa corporal por desequilibrios endócrinos, metabólicos, nutricionales o psíquicos se ocasiona alteración de las líneas y ángulos del triángulo de los vasos arteriales.

El factor neuro muscular resulta responsable cuando el ataque se desencadena por fatiga física o esfuerzo nervioso. La obstrucción intermitente según este factor obedece a que la fatiga y esfuerzo no son permanentes.

Finalmente los factores psicogénicos se observan en los casos cuya sintomatología fué precedida de esfuerzos mentales y emocionales. Estos esfuerzos son comunes y por lo mismo se consideran mecanismos importantes ligados en la etiología del Síndrome.

5. - Anatomía Patológica

Duodenos de cadáveres disecados por Dwight muestran el grado variable de la presión de los vasos mesentéricos en su cara anterior, desde una constricción perceptible con elementos no obstructivos, hasta un surco profundo con casi una obstrucción completa de la tercera porción del duodeno y dilatación proximal marcada.

También estos casos muestran surcos o canales de profundidad variable en la pared posterior del duodeno, producidos por la aorta y el cuerpo vertebral. Staveely estableció que la pérdida de grasa cambia el mesenterio de una banda ancha a estructura cordonosa, la que aumenta el grado de obstrucción. Si se comprime a la vena renal izquierda a su paso por el ángulo arterial, se encuentra el riñón izquierdo congestionado debido a que la vena espermática y ovárica izquierdas desembocan en la vena renal izquierda, puede hallarse varicocele izquierda en el varón y plexo pampiniforme varicoso izquierda.

Otros autores prefieren que cuando se ha practicado biopsia duodenal, en algunos casos no se ha encontrado plexo mioentérico, creemos que este examen deberá practicarse rutinariamente en todos los pacientes operados. Su mayor importancia se aprecia en el diagnóstico diferencial de este Síndrome con el megaduodeno agangliónico.

6. - Sintomatología

La sintomatología de este síndrome varía con la edad y grado de obstrucción intestinal. Puede iniciarse en forma súbita y dramática, o puede ser vaga,

insidiosa y lentamente progresiva. Los síntomas pueden ser agudos, crónicos, recurrentes o intermitentes.

En el recién nacido y en los niños pequeños, los síntomas más frecuentemente observados y referidos por la madre son: vómitos, estreñimiento, deshidratación y oliguria.

En los niños mayores y adultos la sintomatología es variable.

En la forma aguda el cuadro sintomatológico es de una obstrucción intestinal alta, y ocurre sin una historia previa de síntomas gastrointestinales y generalmente es desencadenada por alguna enfermedad prolongada y sin relación, por una herida u operación. Frecuentemente sucede en los pacientes obligados a permanecer en posición supina durante mucho tiempo y sus molestias más frecuentes e iniciales son náusea, distensión y pesantéz abdominal, luego dilatación gástrica y vómitos de tipo bilioso.

En la forma sub-aguda o crónica refiere flatulencia, repetición epigástrica, náusea y vómitos de contenido biliar postprandiales de larga evolución. La repleción frecuentemente es seguida de dolor epigástrico.

A menudo la sintomatología no es tan clara, y su única queja es un malestar epigástrico postprandial vago y mal definido; el cual puede asociarse con anorexia, indisposición, nerviosismo, fatiga frecuente, migraña, depresión mental e inestabilidad emocional, ataques alternos de estreñimiento y diarrea y pérdida de peso.

Algunos pacientes con dichas molestias mal definidas han sido abandonados y clasificados como neuróticos.

Cuando se ha hecho un interrogatorio cuidadoso se observa que las molestias digestivas de algunos - pacientes se iniciaron en la niñez, después de lo cual presentaron muchas mejorías y exacerbaciones espontáneas. Si se presentaron periódicamente, refieren aumento en intensidad y duración de cada crisis en forma progresiva. Al alcanzar la juventud o edad media dichas molestias son mas persistentes y severas y no responden, rápidamente al tratamiento. El dolor epigástrico y la distensión aparecen durante o después de las comidas, - agravándose por la posición erguida y por el ejercicio y comidas copiosas. A menudo refieren opresión epigástrica que les imposibilita terminar de comer, aliviándose tal molestia con la expulsión de gran cantidad de aire y material biliar por medio de los eructos y el vómito. Por lo cual aprenden a ingerir pocos alimentos, lo que les ocasiona pérdida de peso.

Pocas semanas después se exacerbaban los síntomas descritos y el paciente luce crónicamente enfermo por los ataques severos de dolor cólico y vómitos.

En estas condiciones la variedad de medicamentos administrados, el masaje abdominal para eliminar el aire y la dieta especial, ocasionan poco o ningún alivio.

Pero a menudo obtienen alivio con el tratamiento postural (posición genupectoral, decúbito ventral).

Por la frecuencia de determinados síntomas, en cualquier forma del síndrome describiré sus características.

cas. El dolor abdominal es la más importante queja de estos pacientes. Frecuentemente es postprandial; presentándose ordinariamente de una a cuatro horas después de las comidas y muchos pacientes obtienen alivio parcial o total de su dolor, cuando se coloca en decúbito ventral o genupectoral. Con alguna frecuencia el dolor puede tener un ritmo parecido al de la úlcera duodenal, aliviándose temporalmente tras ingestión de alimentos, pero no tiene la periodicidad clásica de la úlcera duodenal. Por esta similitud Bockus hizo el diagnóstico provisional de úlcera duodenal en 35% de sus pacientes antes de la exploración radiológica. El dolor es ocasionado por la distensión gradual debido a la estasis del contenido duodenal entre el píloro cerrado espasmódicamente y de la oclusión de la porción terminal del duodeno por el pedículo mesentérico superior.

El carácter del dolor varía en cada individuo pero se describen como agudo, tenebrante, tipo calambre, tipo cólico, y en la mayoría por una simple sensación de repleción. Se localiza en el epigástrico, en el área umbilical, en el cuadrante abdominal superior derecho, en la región del cartílago xifoides o en la espalda.

Otro síntoma importante es el vómito en la mayoría de los pacientes graves. En un grupo de pacientes el vómito contiene una cantidad abundante de bilis y jugo gástrico, no ocasiona dolor y lo asocian con un píloro insuficiente, con un estómago dilatado, frecuentemente atónico. Es el llamado "vómito por rebosamiento". En otro grupo de pacientes el vómito se presenta al terminar una crisis dolorosa a la cual le brinda alivio

7. Exámenes

a) Examen Físico

Los hallazgos de la exploración física son pocos excepto en los casos de obstrucción marcada y guardan relación con la edad y el grado de obstrucción.

En el recién nacido y niños pequeños, los signos más frecuentes son: los vómitos, pérdida de peso y desequilibrio hidro electrolítico.

En los niños mayores y adultos generalmente - ponen en evidencia a un paciente delgado, de constitución asténica, con visceroptosis y con peso corporal por debajo de lo normal.

El abdomen frecuentemente es liso y péndulo, o excavado y emaciado. En ocasiones el riñón derecho es palpable; puede observarse peristaltismo gástrico y distensión gástrica, y encontrarse hipersensibilidad superficial en la pared abdominal. Cuando en forma concomitante se presenta dilatación gástrica, atonía y ptosis puede hallarse chapoteo gástrico por succusión.

En enfermos muy graves los signos impresionantes son de avitaminosis, desnutrición y desequilibrio hidro electrolítico, cuyos grados clínicos son directamente proporcionales al tiempo de evolución.

En ocasiones se observa que el enfermo se alivia inmediatamente, si durante un episodio de malestar debido a distensión duodenal se practica la maniobra de Hayes: compresión sobre la región inferior del abdo

men, intentando elevar el mesenterio intestinal. El efecto se obtiene cuando se coloca al paciente en el cúbito ventral o en posición geupectoral.

El alivio obtenido se debe a la disminución de la compresión lo cual sugiere el diagnóstico. De lo puesto se deduce que no existe un signo físico patológico.

b) Exámenes Complementarios

Exámenes de Laboratorio: el estudio hematológico revela anemia leve o moderada en el 50% de los pacientes. La investigación de sangre oculta en el jugo gástrico, en el líquido duodenal y en las heces generalmente es negativa. En pacientes con cuadro grave de vómitos, se encuentra hiperazoemia e hipocloremia, poproteinemia, si se adiciona absorción de proteínas defectuosas. Dichas alteraciones de la química sanguínea guardan relación estrecha con el grado de desequilibrio hidroelectrolítico y desnutrición.

No existen cambios característicos en la acidez gástrica. Bockus encontró 25% de acidez normal, 25% de hipoclorhidria y 50% de hiperacidez en sus pacientes, sin embargo, faltó la ascensión final de la curva de acidez observada en los pacientes con úlcera duodenal. Este mismo investigador en sus pacientes encontró el 60% retardo en el vaciamiento del estómago de comida de Ewald, en el 45% tendencia pronunciada a la regurgitación biliar en el estómago y en el 30% biliar en todas las extracciones fraccionadas de jugo gástrico lo que sugiere gastroprosis marcada, insuficiencia pilórica y píloro insuficiente asociado con dilatación e hipotonía gástrica respectivamente.

Es frecuente el hallazgo de numerosas células epiteliales exfoliadas, de modo y de miles de bacterias en el jugo aspirado del duodeno, en los casos de la pinza mesentérica, lo que evidencia una duodenitis concomitante debido probablemente a la estasis duodeno a normal de los alimentos. Puede haber como en cualquier obstrucción orgánica del duodeno retención nocturna de los alimentos y Bockus reporta en el 33% de los pacientes con estasis duodenal anormal presencia de residuos alimenticios después de 16 horas de ayuno y por la mañana en el jugo aspirado del duodeno.

Exámen Radiológico: es el procedimiento de más valor en el diagnóstico de la pinza mesentérica y su diagnóstico clínico solo puede ser confirmado mediante este procedimiento, y mediante la insuflación de aire en el duodeno, de la última hablaremos más adelante. Merece aclararse que la ausencia de signos radiológicos típicos de este síndrome durante cualquier examen para confirmar sus diagnóstico clínico, no la descarta, pues por ser una obstrucción por naturaleza intermitente, puede vaciarse normalmente; por lo cual en estos casos es esencial la serie gastrointestinal repetida.

Se aconseja aprovechar la existencia de una crisis para efectuar este estudio. Si se tiene la sospecha de este síndrome, pero es imposible su demostración por los métodos corrientes de examen, resulta útil en muchas ocasiones seguir la técnica ideada por Engelbach:

Se hace pasar bario a través del duodeno para determinar su trayecto. Después de lo cual con la mano izquierda del explorador se comprime el duodeno transversal contra el cuerpo vertebral; se llena el duo-

deno mediante "ordeño" del antro con la mano derecha del explorador manteniéndose al paciente frente a la pantalla en la posición erguida.

El diagnóstico es positivo en cualquiera de los siguientes casos: Primero: Dilatación del duodeno proximal hasta la porción media del segmento transversal, o retardo en el paso del bario a través de la línea media; cuando la dilatación duodenal es marcada, la silueta de la curva duodenal puede ser muy lisa y parecerse a la del estómago normal y en estos casos se muestra un fondo a la segunda porción y parte proximal de la tercera parecido al que produce la porción más superior de un estómago ptósico. Cuando ocasionalmente la sombra del estómago lleno de bario se interpone y oculta la visualización del asa duodenal; es aconsejable pasar un tubo duodenal, introducir el bario directamente en la segunda porción del duodeno y establecer si la obstrucción se localiza en la parte media de la porción transversal o más allá de dicha región. Mediante esta técnica, se diferenciará este síndrome de la obstrucción del ángulo duodenoyeyunal o en sus proximidades ocasionada por bridas congénitas o por acortamiento del ligamento de Treitz.

El retardo en el paso del bario o retención duodenal, será de seis horas por lo menos si la obstrucción es grave. Puede existir al mismo tiempo retención y dilatación. La retención del bario en el duodeno menor de seis horas con dilatación duodenal proximal a la línea media de la porción transversal no excluye este síndrome. Durante el período de observación roentgenológica (6 horas) no se vacía el duodeno, se estimula el vaciamiento mediante la maniobra de Hayes o mediante la posición genupectoral o decúbito ventral.

Si estas maniobras logran dicha evacuación - con mayor seguridad se establece el diagnóstico.

Segundo: Mediante el estudio fluoroscópico hecho en posición erecta se observa:

- a) Hiperperistaltismo gástrico,
- b) buen funcionamiento pilórico,
- c) el bario encuentra la primera y segunda porción duodenal distendida en grado variable, con líquido en casos severos,
- d) un obstáculo transversal claro en la porción baja de la segunda porción dilatada o en la segunda y tercera porciones dilatadas y se establece la lucha en retroperistaltismo,
- e) en muchos casos, regurgitación duodeno gástrica a través del píloro,
- f) desaparición total o parcial de la signología en posición supina y posición genupectoral o decúbito ventral.

Con respecto a la posición Jones y colaboradores obtienen mejor cuadro fluoroscópico con el paciente inclinado hacia atrás a un ángulo de 30° de la posición erguida.

Tercero: Desaparición de la retención duodenal mediante la maniobra de Hayes o mediante la posición genupectoral o decúbito ventral. La posición de alivio clínico de los pacientes con este síndrome.

Cuarto: Durante el cuadro agudo la placa vacía de abdomen puede mostrar distensión gaseosa del estómago y duodeno, que contrasta con la poca o nula distensión del resto del duodeno.

Como ayuda al examen radiológico anterior se recomienda una serie gastro intestinal completa mediante la cual se evalúa el grado de dilatación y retención del estómago, el grado de suficiencia pilórica, la presencia o ausencia de estasis ileal, y el grado de ptosis y movilidad del colon derecho. También es aconsejable una radiografía lateral de la columna lumbar, para determinar la existencia o no de lordosis.

Los hallazgos del examen fluoroscópico son los más importantes de todos y las radiografías sirven principalmente como un registro permanente y como una ayuda en la evaluación de enfermedades coexistentes.

Insuflación de aire en el duodeno:

Este procedimiento fué usado por Wilkie en 1921, pero más tarde fué abandonado por considerarlo inseguro. Sin embargo la experiencia reciente de Jones y colaboradores, tal como lo han dileneado, es buena y la consideran como un auxiliar útil en el diagnóstico del síndrome.

Se basa en que el duodeno normal es capaz de una distensión mínima porque su envoltura la constituye una capa peritoneal fuerte, con tono muscular fuerte también.

Con la obstrucción intermitente, el peritoneo se estira gradualmente y el tono muscular se reduce hasta que el órgano alcanza un diámetro mayor. Este aumento de diámetro puede no ser aparente al cirujano, a menos que el duodeno se distienda con aire o agua.

Jones y colaboradores para diferenciar el grado

de distensión del duodeno normal del obstruido intermitentemente, estudiaron tres grupos de pacientes: uno sin obstrucción duodenal, otro con obstrucción mecánica y otro con compresión duodenal por los vasos mesentéricos. Los hallazgos mas importantes de este estudio revelaron la marcada distensión ocurrida en los pacientes con obstrucción mecánica, en comparación con la mínima ocurrida en los pacientes sin obstrucción duodenal. El aumento promedio en el diámetro del duodeno en el grupo normal fue de 0.95 centímetros y en el grupo con la Pinza Mesentérica fue de 4.8 centímetros. El aumento de 3 o 4 centímetros del diámetro duodenal al insuflar el aire indica obstrucción duodenal intermitente.

Mediante este procedimiento en la mesa de operaciones hicieron tres diagnósticos que al no haberlos efectuado hubiera pasado desapercibida su patología.

La técnica usada por dichos investigadores se lleva a cabo en sala de operaciones. Después de haber abierto el abdomen; el anestesista introduce 150 a 300 cc. de aire simple dentro del estómago, a través del tubo de Levín intragástrico, con lo cual se observa ligera distensión duodenal y que el aire pasa del duodeno al yeyuno en forma lenta más o menos entre dos y seis minutos, en los pacientes sin obstrucción. En los pacientes con pinzamiento mesentérico se observa duodeno marcadamente distendido hasta el nivel del paquete vásculonervioso mesentérico superior y su diámetro mucho mayor que lo normal y permanece distendido hasta que la raíz del intestino delgado es elevado anteriormente; después de lo cual se produce rápido paso del aire al yeyuno y a veces este paso ocasiona un ruido fuerte que puede ser audible.

Cuando se necesita medir la presión intraluminal, insertan un catéter en el duodeno y lo conectan a un manómetro de agua. En estos casos la cantidad de aire que debe administrarse a través del tubo de Levin debe ser la necesaria para marcar en el manómetro por lo menos 10 centímetros de presión.

De donde recalcan que en presencia de estos datos y de un cuadro clínico, o del hallazgo quirúrgico de un duodeno con cinco o más centímetros de diámetro ponen en aviso al cirujano sobre la existencia de este síndrome.

8. Diagnóstico

a) Diagnóstico Específico.

El diagnóstico de la Pinza Mesentérica es difícil en cualquier edad, pero no imposible y se establece en base de el interrogatorio, la exploración física particularmente con el examen radiológico de la región gastro duodenal y la insuflación de aire en el duodeno.

Sin embargo el diagnóstico definitivo puede hacerse únicamente en la sala de operaciones mediante la celiotomía exploradora. Una vez efectuada ésta la inspección y la palpación lo establecen en los cuadros claros y evidentes. Si el cuadro no es claro ni evidente, la insuflación de aire en el duodeno será de gran ayuda en su diagnóstico y así se podrá brindar en forma satisfactoria el tratamiento indicado.

b) Diagnóstico Diferencial.

Debido a la atipicidad de síntomas y signos de este síndrome, el diagnóstico diferencial deberá esta-

blecerse de otros procesos patológicos que obstruyen el duodeno y que pueden simularlo; tales como: condiciones extrínsecas congénitas y adquiridas.

Entre las congénitas tenemos: bandas y adherencias peritoneales, páncreas anular, duplicación del intestino, membrana colecistoduodeno cólica persistente, anomalías vasculares, vólvulos, megaduodeno agangliónico, divertículo duodenal, mal rotación del colon.

Entre las adquiridas tenemos: bandas y adherencias de origen inflamatorio o postoperatorias, tumores, quistes, agrandamiento de nódulos linfáticos y tracción del músculo de Treitz.

Deberá diferenciarse también de procesos patológicos intra abdominales, que a veces se asocian al síndrome.

Entre ellos tenemos: úlcera péptica, colecistitis crónica, pancreatitis, apendicitis, dilatación gástrica y duodenal postoperatoria (cirugía del abdomen superior) tumores benignos y malignos, lúes, tuberculosis, cuerpos extraños, de la deficiencia neurovascular temporal debido a fatiga, infección o esfuerzo emocional y neurosis.]

La manera de hacerlo es confirmando el diagnóstico específico y excluyendo la patología anterior mencionada.

9. Relación con otras Enfermedades Concomitantes

La Pinza Mesentérica puede coexistir con muchas enfermedades y es bueno tenerlo presente, pues a

veces el cuadro clínico debido a estas enfermedades más severo y oculta o enmascara el cuadro correspondiente al síndrome. Entre ellas tenemos: úlcera péptica, colecistitis, pancreatitis hemorrágica, duodenitis, colon irritable, dilatación aguda del estómago.

Con respecto a la concomitancia con la úlcera péptica, el mecanismo inicial no se ha establecido. Alrededor del 20% de pacientes con pinzamiento mesentérico presentan o han presentado una úlcera duodenal o gástrica y no es probable que éste alto porcentaje sea un hecho accidental. La mayoría de autores opinan que la estasis duodenal sea el factor primario. Wilkie basado en la observación de un paciente con úlcera duodenal simple, se sorprendió al comprobar 5 años más tarde el pinzamiento mesentérico por reactivación de la úlcera. Sospecha que en algunos casos la úlcera duodenal sea la causa predisponente o el factor primario.

Colecistitis: Ocasionalmente se reporta la existencia de colecistitis en estos pacientes. Sin embargo es de la misma frecuencia que en pacientes sin este síndrome.

Pancreatitis hemorrágica: Por el hallazgo en autopsias de pancreatitis hemorrágica asociada con gran dilatación del estómago, Wilkie considera que la estasis duodenal pudo haber sido el factor primario. Experimentalmente en perros Sidel y Brocq llegaron a la misma conclusión que Wilkie. Sin embargo se requiere más pruebas, para poder afirmar el argumento de Wilkie.

Duodenitis: En los casos crónicos la estasis de material séptico en el duodeno puede dar tarde o temprano cierto grado de inflamación crónica en su mucosa.

Colon irritable: Bockus observó en sus pacientes, 25% de frecuencia de esta combinación. Sin embargo ambos cuadros son frecuentes en los pacientes con idéntica personalidad y constitución.

Dilatación aguda del estómago: Ocurre a menudo después de cirugía en pacientes que presentan cierto grado de obstrucción por el pinzamiento mesentérico.

La concomitancia de dichos cuadros patológicos no ha sido observada en niños.

10. Tratamiento

Puesto que no se ha encontrado ningún factor etiológico único en la patogenia de la Pinza Mesentérica, no es posible predecir una curación efectiva.

a) Tratamiento médico: Todo paciente con pinzamiento mesentérico debe ser sometido a tratamiento médico agotando todos los recursos.

En los pacientes con cuadro grave es indispensable la hospitalización e iniciarse tratamiento inmediato con medidas tendientes a combatir los vómitos, corregir el desequilibrio hidro electrolítico, la anemia y los trastornos de la nutrición cuando existan. Además es importante reducir el grado de compresión duodenal por los vasos mesentéricos, mediante la adopción de la posición genupectoral por varios minutos cada hora o cada dos horas. Resultado semejante se obtiene si se elevan los pies de la cama 30 a 40 centímetros, o bien cuando se eleva la parte inferior del abdomen colocando una almohada debajo de las regiones glúteas. Si el peso del paciente ha descendido muy por debajo de lo normal el reposo en cama se mantiene hasta que empie

za a ganar peso satisfactoriamente. El abandono de reposo en cama lo hará gradualmente y en forma progresiva cada día, colocándose una faja abdominal al dejar el lecho, lo cual deberá usar siempre que esté levantado.

A medida que las fuerzas lo permitan, se indican ejercicios abdominales y posturales para reforzar la pared abdominal. Al reanudar sus actividades se recomienda una hora de reposo después de cada comida con lo cual se evita la tensión del mesenterio por el peso de los alimentos. Si en cualquier momento aparecen molestias locales, nuevamente se indica la terapia postural como medida de alivio. Su dieta deberá ser hipercalórica, blanda, de pocos residuos y frecuente, tan pronto como sea posible, hasta la demostración de que el duodeno se vacía normalmente y que no presenta ninguna sintomatología.

Si el cuadro del paciente no es lo suficientemente grave para justificar la hospitalización puede tratarse ambulatoriamente con un régimen dietético semejante al anterior, descanso después de las comidas, el uso de faja abdominal, ejercicios abdominales y vacaciones cortas y frecuentes.

Puede usarse antiespasmódicos, sedantes, heparmatínicos y vitaminas, si es necesario.

En los casos crónicos además del tratamiento ambulatorio descrito anteriormente con frecuencia el éxito de la terapéutica depende de la ayuda que el médico le brinde frente a dificultades familiares, hábitos alimenticios deficientes, problemas sexuales, preocupaciones financieras, condiciones adversas de trabajo y ambiciones sociales. En casos especiales, puede ser ne-

cesario la psicoterapia.

Pool recalca que el tratamiento médico es generalmente adecuado en pacientes con cuadro clínico de evolución corta y únicamente grado moderado de es tasis duodenal comprobado radiológicamente.

El éxito del tratamiento médico se establece por el aumento de peso en forma progresiva, pues su me ta es lograr el acumulo de grasa en todo el cuerpo y es pecialmente en el mesenterio.

b) Tratamiento quirúrgico: Este tratamiento está indicado después del fallo del tratamiento médico más ade cuado.

Generalmente el tratamiento quirúrgico ha sido necesario en aquellos pacientes con:

- 1) Historia de molestias abdominales vagas incontrolables por muchos años.
- 2) Pérdida progresiva de peso y aumento de debilidad mientras está en tratamiento médico.
- 3) Dilatación y estasis pronunciada del duodeno observado en el estudio radiológico.

Rabinovitch, considera que el tratamiento médico no es aplicable a recién nacidos que desarrollan cuadros clínicos de Pinza Mesentérica en los primeros días de vida.

Si después de la Laparatomía exploradora, se encuentra que el cuadro clínico y radiológico de Pinza Mesentérica, se debe a obstrucción duodenal por una -brida congénita o una adherencia, el único tratamiento será la sección del factor obstructivo. Si se debe a la falta de fusión del ciego y el colon derecho, la fijación

de dichos órganos es lo indicado. Y así sucesivamente se practica el tratamiento quirúrgico adecuado en cada uno de los factores simuladores de la Pinza Mesentérica.

En ausencia de dichos factores y ante la confirmación de la deformidad anatómica del duodeno mediante la insuflación de aire en el duodeno o mediante la desaparición de la obstrucción al elevar la raíz del mesenterio, el tratamiento quirúrgico aconsejado consiste en procedimientos de corto circuito.

Entre estos procedimientos tenemos: a) La gastroyeyunostomía que por la alta frecuencia postoperatoria de úlcus péptico marginal ha sido abandonada. Actualmente esta contraindicada. b) Taylor y Hollander, Jones y colaboradores, Tyson y Keegan, Goin y Rabinovitch y colaboradores, Wilk, Mckinnon y Spencer, Bell y Brown, Kaiser y colaboradores sostienen que cuando el tratamiento quirúrgico está indicado en la Pinza Mesentérica no complicada, la duodenoyeyunostomía transmesocólica es el procedimiento quirúrgico de elección. Esta técnica ha dado los mejores resultados y el mínimo de complicaciones.

Otros procedimientos tendientes a resolver el problema obstructivo de la Pinza Mesentérica han sido propuestos. Entre ellos se mencionan: a) la sección del ligamento de Treitz y b) la movilización hacia abajo del duodeno distal descrito por Strong. Mediante el primer procedimiento se moviliza el ángulo duodenoyeyunal y mediante el segundo se evita el paso del segmento distal del duodeno a través de la pinza arterial, evitándose de esta manera su efecto comprensivo. Resultados satisfactorios han sido obtenidos. Sin embargo los procedimientos son recientes y les falta la prueba

de la experiencia o del tiempo para darle su aceptación.

Si además existe úlcera péptica, puede practicarse vagotomía y piloroplastía o la operación de Billroth tipo I combinada con duodenoyeyunostomía.

11. Pronóstico

En general para cualquier edad y sexo, el pronóstico es bueno. Alto porcentaje de pacientes responden de modo satisfactorio al tratamiento médico y los que no responden, necesitan ser sometidos a tratamiento quirúrgico. Generalmente el resultado es muy favorable y la mortalidad es mínima, así como sus complicaciones y recurrencias.

SEGUNDA SECCION

CAPITULO V

MATERIAL Y METODO

A. Material:

1. - Se estudió el grupo de personas afectadas de éste síndrome, hasta la fecha encontrados tanto en el ambiente hospitalario, como en el ambiente privado.
2. - El grupo está constituido por 15 pacientes, de los cuales 8 han sido tratados quirúrgicamente y los restantes (7) han recibido tratamiento médico.
3. - De los pacientes operados 6 han sido intervenidos en el Hospital Roosevelt, 1 en el Centro Médico y 1 en el Hospital Neuropsiquiátrico.

B. Métodos:

Para encontrar este número de pacientes acudí a los archivos hospitalarios y a la información personal de múltiples profesionales que a menudo se relacionan con la patología abdominal.

Desafortunadamente la primera fuente de información no me fué beneficiosa, por no tener clasificados en un solo grupo a este tipo de pacientes, sin embargo del análisis de los registros médicos de estos pacientes, obtuvimos los datos para esta sección.

La segunda fuente me resultó muy valiosa y oportuna, pues no solo me brindó información sino me permitió la evaluación de sus pacientes. Así mismo me animó más a estudiar esta entidad; pues mientras un grupo médico la acepta, otro la desconoce y otro la niega.

La evolución seguida por estos pacientes posteriormente a la realización de su diagnóstico no está periódicamente anotada debido a que muchos al sentirse bien, consideraron conveniente ya no asistir más a sus controles.

En virtud de lo cual consideré necesario acudir a sus hogares para obtener la idea de su estado actual. La localización de sus viviendas, así como la de los pacientes resultó también llena de obstáculos. En unos casos debido a direcciones inexactas y en otros a direcciones incompletas, anotadas en su registro médico.

La descripción de cada uno de los pacientes se encuentra representada en los cuadros I, II, III, IV.

S I N T O M A T O L O G I A

EL DOLOR SE ALIVIA		VOMITOS														Duración de la Enfermedad	Cantidad de peso perdido	EDAD																		
Ejercicios	Posición	Al comer	Con alcalinos	Pirosis	Eructos	Flatos	Regurgitación	Anorexia	Cefalalgia	Fiatulencia	Postprandial	Vértigo	Ictericia	Hemorragia	Estreñimiento				Diarrea	Hemorroides	Debilidad	Pérdida de Peso	Náusea	Antes	Durante	Después	Alimenticio	A + Bilis	Moderados o severos	Ocasionales	Moderado nerviosismo	Severo nerviosismo	Síntomas de enfermedad biliar	Hematemesis	Melena	A
+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	+	24 años
+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	+	21 años
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	+	+28Lbs. 15 años	
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	40Lbs. 57 años	
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	+	35 años	
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8*	-	28 años	
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	+	21 años	
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	10Lbs. 17 años	
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	+	7 años	
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	33 años	
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	19 años	
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	10Lbs. 28 años	
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	+	20 años	
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	+	20Lbs. 20 años	
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	+	27 años	

EXPLORACION FISICA

Temperatura	Talla en centímetros	# Peso en libras	Ginecomastia	Palidez generalizada	Peso deficiente	Cuadro agudo de Obstrucción Intestinal Alta	Ansiedad	Caquexia	Hipersensibilidad Epigástrica	Timpanismo	D. H. E.	Hipersensibilidad Peri-umbilical	Lesiones cutáneas	Abdomen excavado	Hipersensibilidad en cuadrante superior derecho	Ausencia de reflejo nauseoso
N	N	160**	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	N	160**	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	N	165**	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	N	165**	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	N	148**	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	N	166**	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	N	140**	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	N	158**	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

de a datos no anotados en los registros médicos.

; 81; 89; 114; 95; 110.-

Meses

CAPITULO VI

RESULTADOS

En este capítulo analizamos los hallazgos aportados por los diferentes pacientes y que según nuestro criterio son importantes.

A. Estado Civil:

Su frecuencia se observa en el cuadro V.

Cuadro V

Frecuencia según el estado civil

Estado civil	No. de casos	Porcentaje
Solteros	12	80.00%
Unidos	2	13.33%
Casados	1	6.66%
Viudos	0	0.00
Divorciados	0	0.00
Total:	15	99.99%

De donde se deduce que el 80% de nuestros pacientes cuando se demostró su enfermedad eran solteros.

B. Edad:

El grupo de edad promedio de los pacientes estudiados según el cuadro VI oscila entre 21 y 30 años.

Cuadro VI

Frecuencia según el grupo de edad

Grupo de edad	No. de casos	Porcentaje
0 - 10	1	6.66%
11 - 20	5	33.33%
21 - 30	6	40.00%
31 - 40	2	13.33%
41 - 50	0	0.00
51 - 60	1	6.66%
61 - 70	0	0.00
71 o más	0	0.00
Total:	15	99.98%

El paciente de menor edad encontrado fué un niño de 7 años y el de mayor edad fué un paciente de 57 años.

C. Grupo étnico:

En nuestros pacientes estudiados se observó mayor frecuencia en ladinos, lo cual guarda relación con la población general.

D. Sexo:

El sexo más frecuente según el cuadro VII es el masculino y se observó en el 66% de los pacientes estudiados.

Cuadro VII

Frecuencia por sexo

Sexo	No. de casos	Porcentaje
Masculino	10	66.66%
Femenino	5	33.33%
Total:	15	99.99%

E. Ocupación:

Según el cuadro VIII este síndrome es más frecuente en estudiantes. El 40% de los pacientes estudiados presentaban esta característica.

Cuadro VIII

Relación entre la frecuencia y la ocupación

Ocupación	No. de casos	Porcentaje
Estudiante	6	40.00%
Agricultor	2	13.33%
Oficios domésticos	2	13.33%
Mecánico	1	6.66%
Albañil	1	6.66%
* Sin ocupación	1	6.66%
Auxiliar de Enfermería	1	6.66%
Catedrático	1	6.66%
Total:	15	99.96%

* niño

F. Residencia:

Según el cuadro IX, el 73.33% de nuestros pacientes provienen y se desenvuelven en un medio urbano.

Cuadro IX

Relación entre frecuencia y residencia

Residencia	No. de casos	Porcentaje
Urbana	11	73.33%
Rural	4	26.66%
Total:	15	99.99%

G. Sintomatología

La sintomatología referida por nuestros pacientes corresponde a la reportada en otros países. El cuadro X representa la frecuencia de cada síntoma.

Cuadro X

Frecuencia por síntomas

Síntomas	No. de casos	Porcentaje
Dolor abdominal	14	93.33%
Pérdida de peso	12	80.00%

Continuación del cuadro X

Síntomas	No. de casos	Porcentaje
Náusea	11	73.33%
Debilidad	11	73.33%
Anorexia	9	60.00%
Vómitos	8	53.33%
Cefalalgia	8	53.33%
Flatulencia post-prandial	8	53.33%
Nerviosismo	7	46.66%
Pirosis	6	40.00%
Eructos	4	26.66%
Flatos	4	26.66%
Estreñimiento	4	26.66%
Regurgitación	3	20.00%
Melena	2	13.33%
Hematemesis	2	13.33%
Vértigo	1	6.66%

La frecuencia de cada síntoma varía; en tanto que en otros países el vómito es el más constante.

Nosotros establecemos que el dolor abdominal es un síntoma casi constante en nuestros pacientes ---- (93.33%), localizado en la gran mayoría de los casos en el epigastrio; de intensidad variable, desde la simple - sensación de repleción hasta la característica de tipo cólico; raras veces irradiado, sin horario y sin periodicidad; cuya intensidad disminuye con la ingestión de alimentos y antiácidos.

La modificación del dolor con la posición no fué investigada en el interrogatorio, excepto en una paciente privada que refirió alivio en la posición de plegaria mahometana y exacerbación en la posición erguida.

Sin embargo juzgando retrospectivamente en la evaluación a domicilio, el alivio del dolor mediante dicha posición, o mediante los eructos y los vómitos es - muy frecuente, tal como ha sido mencionado por muchos autores y cuando sucede es sugestivo de la existencia de este síndrome.

Otros síntomas muy frecuentes son: la pérdida de peso, la náusea, debilidad, vómitos, flatulencia postprandial. Los cuales pueden aumentar su frecuencia en estos pacientes cuando se les hace un interrogatorio minucioso.

Las características más sobresalientes del vómito referidas por los pacientes con este síntoma se establece en el cuadro XI.

Cuadro XI

Frecuencia de las características del vómito
en el síndrome de la Pinza Mesentérica

Características	No. de casos
Precedido de náusea	10
Contenido alimenticio	9
Después de las comidas	8
Moderado o severo	7
Ocasionales	5
Contenido biliar	4
Durante las comidas	3
Antes de las comidas	0

H. Relación entre el grupo de edad y el cuadro clínico del paciente durante el cual se efectuó el diagnóstico.

Según el cuadro XII en el 66,66% de nuestros pacientes el diagnóstico de Pinza Mesentérica fué hecho durante la fase aguda del síndrome.

Cuadro XII

Grupo de edad	Forma aguda		Forma crónica		Total:
	No. de casos	Porcentaje	No. de casos	Porcentaje	
0 - 10	1	6.66%	0	0.00%	1
11 - 20	3	20.00%	2	13.33%	5
21 - 30	4	26.66%	2	13.33%	6
31 - 40	1	6.66%	1	6.66%	2
41 - 50	0	0.00%	0	0.00%	0
51 - 60	1	6.66%	0	0.00%	1
61 - 70	0	0.00%	0	0.00%	0
Total:	10	66.66%	5	33.33%	15

A pesar de que el diagnóstico ha sido hecho durante el cuadro agudo en la gran mayoría de las veces, un buen número de los pacientes estudiados, refieren sintomatología de larga evolución, muchos desde la niñez, con períodos de exacerbación y remisión espontánea. De los casos estudiados el de más corta evolución fué de 84 horas; desarrollado por un paciente de 28 años de edad, y el de más larga evolución fué desarrollado por un paciente de 21 años de edad, quien desde su niñez presentaba este síndrome en forma recurrente. Ambos fueron operados con resultados excelentes.

I. Hallazgos Físicos

Igual que en otros países la exploración física en los pacientes estudiados no reveló muchos datos excepto en los casos de obstrucción severa. En el cuadro XIII en orden de frecuencia se anotan los encontrados.

Cuadro XIII

Signo	No. de casos
Peso por debajo de lo normal	12
Hipersensibilidad epigástrica	4
Palidez generalizada	3
Signos de obstrucción intestinal severa	2
Timpanismo	2
Desequilibrio hidroelectrolítico	2
Caquexia	2
Ansiedad	1
Hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho	1
Dolor periumbilical	1
Lesiones cutáneas	1
Abdomen excavado	1
Ginecomastía discreta	1
Ninguno	1

En ninguno de los pacientes se reportó el resultado de la maniobra de Hayes.

El signo más llamativo por su casi constancia fué el peso del paciente por debajo de lo normal. Algunas veces en forma leve y muchas veces en forma severa.

Por no estar anotado en todos los registros médicos no analizamos la cantidad de peso perdido según los diversos factores.

J. Exámenes Complementarios

En general los de rutina y especiales no se efectuaron en todos los pacientes. De los realizados en el preoperatorio los más llamativos son: en 13 de los pacientes la investigación de hemoglobina y hematocrito resultó normal en diez y por debajo de lo normal en tres de ellos. En seis pacientes operados la curva de acidez mediante la estimulación de la histamina resultó en cuatro normal y en dos alta.

De los exámenes radiológico e insuflación duodenal, por ser importantes hablaremos posteriormente.

K. Diagnóstico

El diagnóstico clínico también resultó difícil en los pacientes estudiados, tal como sucede en otras partes. A ninguno se le ordenó estudio radiológico por el síndrome de la Pinza Mesentérica. Todos nuestros casos estudiados han sido diagnosticados por el Radiólogo y el Cirujano.

El cuadro XIV representa dichas opiniones

Relación entre el Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Radiológico y el Diagnóstico Preoperatorio

Identificación	Diagnóstico	
	Clinico	Radiológico
Paciente No. 1 Reg. Médico 94750	Gastritis hipertrofica	Pinza Mesentérica
Paciente No. 2 A.B.A.	Obstrucción incompleta del duodeno por tumor congénito	Quiste Mesentérico
Paciente No. 3 Reg. Médico 97228	Úlcera gástrica	Pinza Mesentérica
Paciente No. 4 Reg. Médico 100632	Ca gástrico	Pinza Mesentérica
Paciente No. 5 Reg. Médico 818-61	No específico "Dolor epigástrico y vómitos"	Pinza Mesentérica
Paciente No. 6 Reg. Médico 150913	Úlcera duodenal penetrante	1) Úlcera duodenal 2) Pinza Mesentérica
Paciente No. 7 Reg. Médico 156726	1) Obstrucción del canal pilórico 2) Enfermedad péptica	Úlcera gástrica prepiórica Úlcera duodenal
Paciente No. 8 Reg. Médico 141732	Úlcera duodenal	Pinza Mesentérica

Los pacientes Nos. 1, 3, 4, 6, 7 y 8 corresponden al Hospital Roosevelt; el paciente No. 2 al Centro Médico y el No. 5 al Hospital Neuropsiquiátrico. -

La figura No. 1 muestra algunos hallazgos radiológicos comunes en nuestros pacientes.

Registro radiológico: 2449 -Fecha: 16/abril/ 64. -

Foto No. 1: El estudio radiológico de estómago y duodeno después de la ingestión del bario muestra moderada distensión de la segunda porción duodenal y obstrucción - por obstáculo transversal entre la segunda y tercera porciones.

Quedando demostrado que en el 87.5% de los pacientes estudiados, el diagnóstico fue hecho por el Radiólogo y el 12.5 % restante fue hecho por el Cirujano en la mesa de operaciones.

Lo anterior nos enseña que en presencia de la sintomatología y signología del tracto gastrointestinal superior, deberá descartarse la existencia de este síndrome.

No se establece la relación con los 7 pacientes restantes, en virtud de no estar operados.

Es importante señalar que el diagnóstico radiológico fue elevado a pesar de que solo al 50% se le practicó estudio fluoroscópico. El paciente cuyo diagnóstico fue hecho por el Cirujano no tuvo estudio fluoroscópico en el preoperatorio.

La imagen radiológica producida por este síndrome se presenta en las fotografías que a continuación se presentan.

(verse en las pág. 57 y 58)

Reg. radiológico: 3503-62
Fecha: 30/mayo/62

Foto No. 2: En la posición oblícua izquierda y en decúbito dorsal se observa obstrucción parcial en la segunda porción duodenal por obstáculo transversal.

Reg. radiológico: 1274-64
Fecha: 14/marzo/64

Foto No. 3: Obstrucción de la segunda y tercera porción. Edema de la mucosa duodenal.

Factores concomitantes

Los factores concomitantes encontrados en -
nuestros pacientes y representados en el Cuadro XV de-
ben tomarse en cuenta en la explicación etiológica del
síndrome.

Cuadro XV

Factores concomitantes

Factores concomitantes	No. de casos	Porcentaje
Ninguno	7	46.66%
Úlcera duodenal	2	13.33%
Bocio nodular tóxico	1	6.66%
Lupus eritematoso diseminado	1	6.66%
Psicosis epiléptica	1	6.66%
Tuberculosis paren- quimatosa difusa y reacción psiconeuró- tica	1	6.66%
Hiponutrición	1	6.66%
Enfermedad péptica	1	6.66%
Total:	15	100.00%

M. Tratamiento

Afortunadamente y en forma accidental un grupo de los pacientes estudiados tuvo tratamiento quirúrgico y el otro tratamiento médico.

Todos los pacientes estudiados tuvieron en principio tratamiento médico en forma completa o incompleta. Ante el fallo del tratamiento médico fueron operados y los restantes continuaron con tratamiento médico. Los cuadros XVI y XVII representan los resultados obtenidos durante la evolución a domicilio.

Relación entre la forma clínica del síndrome y la respuesta al tratamiento médico

Identificación	A Forma Aguda	B Forma Crónica	(*) Completo		(**) Incompleto		Resultados (***)
			A	B	A	B	
L.K.	sí	sí	sí			sí	3 años después Bueno
159118	sí	sí	sí			sí	5 meses después Bueno
38691		sí				sí	(****)
109141	sí	sí	sí			sí	2 años 8 meses después. Bueno
148193		sí				sí	Malo
1524	sí	sí	sí			sí	11 meses después Bueno
115-63		sí				sí	(****)

(*) Tratamiento completo cuando se cumple todo lo mencionado en el capítulo correspondiente en la - sección primera.

(**) Tratamiento incompleto cuando se deja de cumplir alguna de sus partes.

(***) Resultado excelente: Si está asintomático o el estudio radiológico muestra vaciamiento normal del duodeno. Resultado bueno: Persistencia de molestias abdominales vagas y ausencia de signos obstructivos. Resultado malo: Ninguna mejoría.

(****) No localizado.

CUADRO XVII

Relación entre la forma clínica del síndrome y la respuesta al tratamiento quirúrgico

Identificación	Forma Aguda	Forma Crónica	Operación	Resultados (****) Postoperatorios
94750		sí	Duodenoyeyunostomía	3 años dos meses después. Bueno.
A.B.A.	sí		Liberación de la Arteria mesentérica superior	2 años 9 meses después Excelente
97228	sí		Duodenoyeyunostomía	2 años 7 meses después Excelente
100632	sí		Duodenoyeyunostomía	11 meses después Excelente
818-61	sí		Duodenoyeyunostomía y Liberación del ángulo de Treitz	10 meses después Excelente
150913	sí		Duodenoyeyunostomía	9 meses después Excelente
156726	sí		Duodenoyeyunostomía	6 meses después Bueno
Total:				

CUADRO XVII

Relación entre la forma clínica del síndrome y la respuesta al tratamiento quirúrgico

Identificación	Forma Aguda	Forma Crónica	Operación	Resultados (****) Postoperatorios
94750		sí	Duodenoyeyunostomía	3 años dos meses después. Bueno.
A.B.A.	sí		Liberación de la Arteria mesentérica superior	2 años 9 meses después Excelente
97228	sí		Duodenoyeyunostomía	2 años 7 meses después Excelente
100632	sí		Duodenoyeyunostomía	11 meses después Excelente
818-61	sí		Duodenoyeyunostomía y Liberación del ángulo de Treitz	10 meses después Excelente
150913	sí		Duodenoyeyunostomía	9 meses después Excelente
156726	sí		Duodenoyeyunostomía	6 meses después Bueno
Total:	7	1		

Lo expuesto proporciona una idea gruesa de la supremacía del tratamiento quirúrgico.

El cuadro XVIII siguiente proporciona una idea más fina del tratamiento quirúrgico.

Cuadro XVIII

Cuadro comparativo de los resultados obtenidos en el tratamiento de la forma aguda y crónica

T r a t a m i e n t o

Resultados	Medico		Quirurgico	
	Agudo	Crónico	Agudo	Crónico
Malo	0	1	0	0
Bueno	4	0	2	1
Excelente	0	0	5	0

Hay que hacer constar que los pacientes operados fueron intervenidos en su mayor parte en condiciones delicadas después del fracaso del tratamiento médico.

A pesar de ello la operación en 7 pacientes - es con cuadro agudo, dió en 5 resultados excelentes y en 2, resultados buenos. En tanto que el tratamiento médico en los cuadros agudos solo dió resultados buenos.

En el cuadro crónico el resultado fué bueno - con el tratamiento quirúrgico, mientras que fué malo - con el tratamiento médico.

La operación practicada fué duodeno-yeyunos
sus resultados nos confirman la confianza otorga
muchos Cirujanos internacionales.

Las figuras Nos. 4, 5 muestran el resultado de
amiento quirúrgico

Reg. radiológico: 7685-63

Fecha: 16/agosto/63

Fig. No. 4: En el estudio radiológico preoperatorio se
observa ingurgitación duodenogástrica y obstrucción par-
cial por franco obstáculo transversal en la segunda por-
ción duodenal.

Foto No. 5: El control postoperatorio demuestra despa-
-rición de la distensión duodenal por obstrucción y buen
funcionamiento de la derivación duodeneyunal.

Reg. radiológico: 7685-63
Fecha: 4/octubre/63

N. Hallazgos quirúrgicos.

Los hallazgos quirúrgicos encontrados en los pacientes operados se reportan en el cuadro XIX.

Cuadro XIX

Hallazgo quirúrgico	No. de
Duodeno proximal dilatado	7
Adherencias en vías biliares	1
Linfoadenitis mesentérica	1
Epiplón gastro cólico muy corto	1
Ligamento de Treitz muy alto	1
Adherencias peritoneoduodenales	1
Páncreas aberrante	1

O. Insuflación de aire en el duodeno.

Este procedimiento solo fué efectuado en 3 pacientes, en 2 de ellos corroboraron el diagnóstico radiológico de Pinza Mesentérica. Las medidas de los diámetros duodenales (5.5 - 7 centímetros y 8-9 centímetros) resultaron francamente típicas. En el caso restante se vió para hacer el diagnóstico de Pinza Mesentérica sospechado en el examen radiológico.

P. Pronóstico.

Gracias al cuadro clínico vago, a su carácter recurrente, al lugar de la obstrucción, a la respuesta favorable y asombrosa del tratamiento quirúrgico el pronóstico es bueno.

Muchos de nuestros pacientes fueron intervenidos en malas condiciones, sin embargo en ninguno de ellos se observó complicación alguna. Finalmente el hecho de no haberse reportado ningún caso, ni tampoco haberse encontrado accidentalmente en la sala de necropsias, afirman la benignidad del síndrome.

CAPITULO VII

DISCUSION

El síndrome de la Pinza Mesentérica ha sido descrito en la literatura médica como una entidad rara. La frecuencia exacta no se conoce. Lo vago de su sintomatología abdominal y los pocos hallazgos físicos inespecíficos hacen pasar desapercibida esta entidad clínica. Su diagnóstico radiológico está sujeto a factores personales, al parecer cualitativos; pues mientras un grupo observa este síndrome a menudo, otro no lo observa o lo pasa desapercibido.

Ese factor de apreciación cualitativa reportado en otros países, se observa también en nuestro medio.

Esa divergencia cualitativa en la apreciación de hallazgos radiológicos en el mismo estudio y su correlación con la sintomatología clínica del mismo paciente, pude observarla en el caso que me llevó a hacer este trabajo. Pues mientras que para un Radiólogo el cuadro era el de Pinza Mesentérica, para otro correspondía a duplicación duodenal. Sin embargo se decidió su intervención quirúrgica con el diagnóstico de Pinza Mesentérica.

Los casos analizados en este trabajo han sido diagnosticados por el mismo Radiólogo, excepto uno que no fué sospechado radiológicamente y cuyo diagnóstico se hizo en la mesa de operaciones, al no encontrar la patología sospechada clínicamente y al investigar la posibilidad de Pinza Mesentérica. Para mayor mérito del Radiólogo, en 7 pacientes llevados a la mesa de operaciones por cuadro agudo del síndrome, se corroboró el diagnóstico radiológico.

En forma especial merece mencionarse que en los pacientes estudiados, su frecuencia mayor se observó en estudiantes, en solteros, comprendidos entre 21 y 30 años; la molestia primordial fué la pérdida de peso y el dolor abdominal; el hallazgo físico más común fué su peso por debajo de lo normal, y sin ninguna complicación concomitante en 7 de ellos.

Esto no es lo corrientemente reportado en otros países. Estudios posteriores, en un número mayor de pacientes, nos permitirán afirmar estas conclusiones.

El resultado satisfactorio obtenido con el tratamiento médico en cualquier forma clínica reportado en otros países, no se observa en el nuestro. Muchos factores son los responsables de su fracaso, por ejemplo el tratamiento incompleto, mala colaboración por parte del paciente, etc. Siendo recomendable conducir el tratamiento médico en forma completa para evaluar los resultados.

En tanto no se establezca un buen tratamiento médico, el quirúrgico seguirá siendo excelente en cualquier forma del síndrome, y el único indicado cuando se obtenga resultado satisfactorio con la conducta conservadora.

En la gran mayoría de pacientes el procedimiento quirúrgico practicado ha sido la duodenoyeyunostomía. Procedimiento que ha sido usado en otros países con resultados adecuados. A pesar de que todos nuestros pacientes han sido intervenidos en malas condiciones generales los beneficios otorgados a ellos mediante esta operación son satisfactorios, en base a que hasta el momento no han producido complicaciones y la curación ha sucedido en casi el 100%.

CAPITULO VIII

CONCLUSIONES

1. - Corresponde a los Doctores Adán García Padilla y Rodolfo Solís Hegel, el mérito de haber hecho el primer diagnóstico de Pinza Mesentérica en Guatemala.
2. - Mayor número de pacientes se encontrarán, si el Internista, el Radiólogo y el Cirujano, se mantienen alertas constantemente ante molestias abdominales vagas.
3. - Estudios radiológicos repetidos son aconsejables en los casos dudosos.
4. - El diagnóstico es más fácil y seguro si se hace durante un episodio agudo.
5. - El diagnóstico se hizo en el 87.5% durante el cuadro agudo y en el 12.5% en los pacientes operados.
6. - De los pacientes operados, en el 87.5% se hizo diagnóstico radiológicamente y en el 12.5% se hizo el diagnóstico en la mesa de operaciones.
7. - En el 100% de los pacientes llevados a la mesa de operaciones por el síndrome de la Pinza Mesentérica se comprobó el diagnóstico radiológico.
8. - El diagnóstico clínico no fue hecho en ninguno de los casos operados.

70

9. - La insuflación de aire en el duodeno, es recomendable en la duda diagnóstica o ante la existencia de factores concomitantes comunes.
10. - La incidencia fué de 80% en pacientes solteros.
11. - La incidencia es de 66,66% para el sexo masculino y de 33,33% para el sexo femenino.
12. - La edad promedio en nuestra serie está comprendida entre los 21 y 30 años.
13. - El síndrome existe en la raza indígena.
14. - El tratamiento médico se administró en forma incompleta, en nuestros pacientes.
15. - El tratamiento médico debe administrarse en forma completa.
16. - El tratamiento quirúrgico está indicado después de fallar el tratamiento médico, o ante la pérdida progresiva de peso y aumento de debilidad a pesar de estar bajo tratamiento médico.
17. - La operación de elección en los casos no complicados es la duodenoyeyunostomía.
18. - El pronóstico del síndrome es bueno.
19. - La mortalidad es de 0%.

CAPITULO IX

SUMARIO

1. - La Pinza Mesentérica u oclusión arteriomesentérica del duodeno es un síndrome clínico caracterizado por síntomas y signos agudos, o recurrentes, o intermitentes o crónicos.
2. - Frecuentemente se observa en personas delgadas con molestias abdominales vagas.
3. - La fisiopatología, el cuadro clínico y los factores concomitantes han sido descritos.
4. - Es relativamente raro; observado más o menos una vez entre cada 300 enfermos en dos encuestas hospitalarias en las que se practicaron estudios radiológicos de estómago y duodeno.
5. - En general el cuadro clínico y el radiológico de nuestros pacientes son los mismos, que los reportados por otros países.
6. - El hecho de ser soltero, estudiante y joven, - pueden ser factores importantes en los casos - sin enfermedades concomitantes.
7. - El diagnóstico radiológico no es absoluto, pero si de confianza en especialistas de experiencia.
8. - La insuflación de aire en el duodeno en la mesa de operaciones, es un procedimiento auxiliar de mucho valor en el diagnóstico definitivo de este síndrome.

9. - Deberá descartarse la existencia de este síndrome cuando el tratamiento quirúrgico está indicado por ulcus péptico.
10. - Deberá investigarse este síndrome en aquellos pacientes ulcerosos con mala respuesta al tratamiento quirúrgico.
11. - En cualquier forma del síndrome, el tratamiento de elección es médico. Si éste falla está indicado el tratamiento quirúrgico.
12. - El procedimiento quirúrgico de elección es duodenoyeyunostomía.
13. - Los 15 pacientes de nuestra serie, en la gran mayoría de las veces se caracterizan por ser estudiantes, ser solteros, estar comprendidos entre los 21 y 30 años, referir pérdida de peso, dolor abdominal; y tener peso corporal por debajo de lo normal.
14. - De los 8 pacientes operados, uno es de raza indígena. El cuadro clínico lo desarrolló estando hospitalizado en el Neuro psiquiátrico por Psicosis epiléptica.
15. - En los casos estudiados se observa la existencia del síndrome en niños y adultos. -

CAPITULO X

APENDICE

Al iniciar el presente trabajo, en sus primeras páginas enfoqué la causa que me llevó a escribirlo. Hoy a manera de final al mismo, y como un ejemplo de los hallazgos más destacados durante el cuadro agudo de este síndrome, describiré los encontrados en el primer paciente que tuve la oportunidad de observar. Ellos son para mi un recuerdo eterno; ellos son los que inspiraron este trabajo. Después de lo cual por su importancia histórica reportaré el primer caso diagnosticado radiológicamente y comprobado quirúrgicamente.

J. R. G. A., con Registro médico No. 150913, - Mecánico, de 28 años de edad ingresó el 31 de marzo de 1964 a los servicios de Emergencia de el Hospital Roosevelt, con una historia de dolor abdominal y sudoración profusa ocasional de 9 horas de evolución. Iniciado espontáneamente y en forma leve en el epigastrio. Con el transcurso de las horas el dolor aumentó de intensidad y se tornó de tipo cólico.

Antiespasmódicos administrados parenteralmente en centros asistenciales y vómitos alimenticios precedidos de náusea durante la crisis dolorosa le ocasionaban moderado alivio.

Seis meses antes de su ingreso expulsó entre las heces un parásito blanco, plano y largo.

El examen físico reportó paciente angustiado, - intranquilo, quejumbroso con crisis dolorosas acompañadas de diaforesis y que lo obligan a inclinarse sobre los muslos, posición en la cual parecía aliviarse.

Además hipersensibilidad epigástrica, ruidos intestinales escasos, ningún signo de irritación peritoneal, puño percusión dolorosa en área renal izquierda.

Durante la observación médica estrecha el paciente presentó el mismo cuadro clínico varias veces al día, nunca se detectó signo de irritación peritoneal, pero sí hipersensibilidad en hipocondrio izquierdo. En una ocasión el cuadro dramático fué desencadenado por la ingestión de una pequeña cantidad de alimento obtenido por el paciente en forma extra oficial. Exámenes de laboratorio de rutina y especiales, así como placa vacía de abdomen y pielograma intravenoso, no mostraron ninguna anormalidad. Posteriormente resultó positiva la investigación de sangre oculta en el contenido de un vómito alimenticio.

La realidad clínica en esa ocasión ante el enfermo evidente cuya patología no podía establecerse era incierta. Prueba de ello son las distintas posibilidades diagnósticas apuntadas, tales como: obstrucción intestinal y litiasis renal izquierda, cólico saturnino, úlcus duodenal con nicho penetrante y pancreatitis aguda edematosa.

Afortunadamente la exploración radiológica del estómago y duodeno reveló la existencia de un nicho ulceroso grande en el duodeno y además la primera y segunda porción duodenal marcadamente distendida por obstrucción transversal entre la segunda y tercera porción duodenal; imagen radiológica típica de pinzamiento del duodeno por los vasos mesentéricos; lo cual dió solución al cuadro clínico.

Hasta el momento del estudio radiológico anterior (84 horas después de su ingreso) se le había trata-

do con antiespasmódicos parenterales, reposo gástrico, y soluciones adecuadas para el mantenimiento de su equilibrio hidroelectrolítico, lo cual solo le había proporcionado alivio parcial y temporal.

Es digno de mencionar que en dos episodios se alivió el cólico con la administración de agua destilada por vía intramuscular y que en una ocasión la succión nasogástrica durante 12 horas reportó un volumen de contenido gastroduodenal de 1100cc.

Por la intermitencia del cuadro y el fallo del tratamiento médico durante 15 días se llevó a la mesa de operaciones donde después de la celiotomía se encontró dilatación duodenal en su segmento proximal debido a los vasos mesentéricos superiores. No se encontró úlcera duodenal; ni ninguna otra patología; lo cual comprobó el diagnóstico radiológico y diagnóstico preoperatorio de Síndrome de la Pinza Mesentérica.

Se le practicó duodenoyeyunostomía latero lateral y la evolución postoperatoria inmediata fue satisfactoria.

Controles postoperatorios en diversas ocasiones no revelaron ninguna sintomatología. El último efectuado 8 meses después de la operación dió igual resultado; por lo que se concluye que el tratamiento quirúrgico en este paciente fue excelente.

En las radiografías insertadas a continuación se aprecian esos resultados.

Registro radiológico 2524-64
Fecha: 3/Ab./64.

Foto No. 6: Estudio radiológico de estómago y duodeno después de la ingestión del bario muestra primera y segunda porción duodenal marcadamente distendida por obstrucción transversal entre la segunda y tercera porciones. Mucosa duodenal edematizada y nicho ulceroso grande.

Registro radiológico 2524-64
Fecha: 29/Ab./64.

Foto No. 7: Estudio postoperatorio muestra desaparición de la obstrucción. Derivación duodenoyeyunal. Persistencia de nicho (que no fué encontrado en la operación). Arritmia duodenoyeyunal (*).

(*) Término referido personalmente por el Dr. Adán García Padilla.

La contribución en el campo médico de Guatemala por los profesionales Dr. Adán García Padilla y Dr. Rodolfo Solís Hegel, al hacer el primer diagnóstico del síndrome de Pinza Mesentérica en nuestro medio, hasta no demostrar lo contrario, es trascendental, lo que describiré los hallazgos encontrados en el primer paciente con este síndrome.

J. A. M. S., con Reg. médico No. 94750 de 24 años de edad, sexo masculino, soltero, estudiante, originario y vecino de la capital, con historia de sensación de plenitud excesiva y dolor abdominal epigástrico, generalmente postprandiales; de eructos malolientes y frecuentes; de inapetencia para los alimentos grasos, para el café y para comidas condimentadas; de cefalea frontal, fotofobia, dolor retroesternal, dolor en hipocostrio derecho e irritabilidad ocasionalmente; de estreñimiento frecuentemente. Todos de más o menos 8 años de evolución, 2 años antes tuvo melena después de ingerir alcohol etílico.

El examen físico únicamente reveló caries dental. Por la sospecha clínica de gastritis hipertrófica y úlcera péptica se le ordenó una serie gastroduodenal.

El 26 de septiembre de 1961, el Dr. Adán García Padilla en forma acertada e inteligente interpreta dicho estudio radiológico con la impresión de "Obstrucción parcial duodenal atribuible al síndrome de obstrucción mesentérica".

Por lo trascendental de este suceso transcribo textualmente el informe oficial dado en esa oportunidad.

"El estudio radiográfico, y fluoroscópico demuestra que

el esófago y estómago tienen forma, tamaño y motilidad normales. No hay signos de ulceración ni cambios inflamatorios. El canal pilórico tiene buena motilidad y se llena el bulbo duodenal que se distiende bien, al pasar el medio de contraste hasta la segunda porción del duodeno hay ligero grado de obstrucción transitoria en su porción terminal, observándose inmediatamente peristaltismo vigoroso y antiperistaltismo con regurgitación del bario hasta el estómago. En cambio de posiciones el bario pasa libremente hasta la segunda porción. Esta obstrucción se hace más marcada en la posición erecta".

El 28 de octubre de 1961, correspondió al Dr. Rodolfo Solís Hegel llevar a cabo en la mesa de operaciones, la parte más difícil y decisiva en la confirmación del diagnóstico radiológico y preoperatorio. Sólo la seguridad en sus conocimientos le hizo lanzarse en tal empresa. La exploración de la cavidad abdominal reveló duodeno dilatado comprimido en su tercera porción por los vasos mesentéricos; epiplón gastro cólico sumamente corto y ligamento de Treitz muy alto. La insuflación de aire en el duodeno logró distensión del mismo de 5.5 a 7.5 centímetros con lo cual se comprobó el diagnóstico de compresión duodenal por los vasos mesentéricos. Después de lo cual le practicó una enteroanastomosis duodenoyeyunal en forma exitosa.

Desafortunadamente los controles postoperatorios no fueron efectuados por falta de asistencia del paciente. Evaluación a domicilio hecha tres años dos meses después de la intervención quirúrgica, revela mejoría franca en su sintomatología. No fué posible la remisión completa de la misma, debido probablemente a su inestabilidad emocional, problemas de conducta, etc. que ya tenía desde antes de la operación.

Las fotografías a continuación insertadas ilustran parcialmente lo enunciado anteriormente.
Reg. radiológico No. : 5659-61
Fecha: 26/Sept./1961

Fig. No. 8: En el celiograma se ve marcado hiperperistaltismo duodenal por obstrucción parcial en la segunda porción en la posición erecta (Flecha).

de incision en el mesocotón transverso.

Foto No. 9

Foto No. 10

B I B L I O G R A F I A

1. - Albrecht, P. A. : Uber Arterio-mesenterial en Darmverschluss, and der Duodeno-jejunalgrenze, and seine ursächliche Beziehung zur Magenverwiterung. Virchows. f. path. Anat. 156: 285-328, 1899. Cited by Jones, S. A., et al (17).
2. - Anderson, W. A. D. : Pathology. The C. U. - Mosby Company St. Louis, 1953.
3. - Berley, F. V. , and Brown, R. B. : Arteriomesenteric Obstruction of the Duodenum. U. S. Armed Forces M. M. 5: 1044-1052.
4. - Bitner, W. P. Arteriomesenteric occlusion of the duodenum. Am. J. Roentgenol. 79: 808, 1958. Cited by de Vito (12).
5. - Bloodgood, J. C. : Acute Dilatation of the Stomach-Gastromesenteric Ileus. Ann. Surg. 46: 736-762, 1907. Cited by Jones, S. A. et al (17).
6. - Bockus, H. L. : Intermittent arteriomesenteric occlusion of the duodenum with dilatation and stasis. Penn. Med. J., 32:618, 1929. Cited by Jones, S. A., et al (17).
7. - Bockus, H. L. : Gastroenterología, Vol. II, - Barcelona Buenos Aires, Salvat Editores, S. A. 1948 y 1964.
8. - Boy, W. : Tratado de Patología General y Ana

- tomía Patológica, Argentina. Librería y Editorial Bernades, S. R. L., 1959.
9. - Christopher, : Tratado de Patología Quirúrgica Tomo I, México, Editorial Inter Americana, 1961.
 10. - Codman, E. A. : Chronic Obstruction of the Duodenum by the Root of the Mesentery, *Bull. M. & S. J.* 158:503-510, 1908. Cited by Goin and Wilk (15)
 11. - Conner, L. A. : Acute dilatation of the stomach and its relation to mesenteric obstruction of the duodenum. *Tr. A. Am Physicians*, 21:579, Cited by Jones, S. A., et al. (17).
 12. - De Vito, Rober V. : Surgery of the stomach and duodenum. Boston: L. H. C., Brown and Company, 1962.
 13. - Dwigth, T. J. : *Anat y Physiol.*, 1897. Cited by Jones, S. A., et al. (17).
 14. - Engelbach, W. : Arteriomesenteric Occlusion of the Duodenum *J. Roentgenol.* 1:45-57, 1916. Cited by Goin and Wilk (15).
 15. - Goin, L. S., and Wilk, S. P. : Intermittent Arteriomesenteric Occlusion of Duodenum, *Radiology* 67:729-737 (Nov.) 1956.
 16. - Harrison, T. R. : *Medicina interna México*, Editorial Prensa Médica Mejicana 1962.
 17. - Jones, S. A., et al. : Arteriomesenteric duodenal occlusion.

- nal compression Amer. J. Surg., 100: 262-277, - 1960.
18. - Kaiser, George D., M.D. McKain, John M. M.D. and Schumacker Harris B. Jr. M.D. F.A.C.S. - Indianápolis, Indiana. The superior mesenteric - Artery Syndrome. Surgery Gynecology e Obstetrics 110:133-194, 1960.
19. - Kauffman, R. R., and Gerbode, F.: Arteriomesenteric duodenal ileus. Stanford Med. Bull., 9:262, 1951. Cited by Jones, S. A., et al. (17).
20. - Kellogg, E. L., and Kellogg, W. A.: Chronic Duodenal Obstruction with Duodeno jejunostomy as a Method of Treatment. Ann. Surg. 73:578-608, May 1921. Cityed by Goin and Wilk (15).
21. - Kettenbach, E. L. and Palombo, L. T.: Arteriomesenteric Duodenal Compression: Surgical Treatment, A. M. A. Arch, Surg. 62:145-149 (Jan) 1951. Cited by Tyson and Keegan (43).
22. - Lambert, C. J., Fiths, F. O. and Turk, R.: Duodenal diverticulum: an unusual cause of "Secondary superior mesenteric artery syndrome". Am. J. Surg., 101: 805, 1961. Cited by McKinnon ad Spencer -- (25).
23. - Licht, E. de F. Arteriomesenteric obstruction of - the duodenum in adult life and adolescence. Acta radiol. 45:441, 1956. Cited by De Vito (12).
24. - Maingot Rodney: Abdominal Operations, New -- York, Appleton Century crofts, Inc. 1961.

25. - McKinnon, D. A. and Spencer, R. : Superior mesenteric artery syndrome Amer. J. Rug., 106:552-557, 1963.
26. - Mead, C. H. and Wells, A. H. : Presentation of case (duodenal obstruction due to superior mesenteric artery pressure). Minnesota Med 27:822-824, Oct. 1944. Cited by Berley and Brown (3).
27. - Orr, T. G. : Operaciones de Cirugía General, México, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1954.
28. - Pool, E. H., Niles, W. L. and Martin, R. A. - Duodenal stasis: duodenojejunostomy. Ann. Surg 98:587-1933. Cited by Jones, S. A., et al. (17)
29. - Prouty, M., and Waskow, W. L. : Duodenal compression by the Mesenteric artery. J. Pediat., 50:734, 1957. Cited by Taylor and Hollander (40).
30. - Quiroz Gutiérrez, F. : Anatomía Humana, Tomo III, México, Editorial Porrúa, S. A. 1962.
31. - Rabinovitch, J., Pines, B., and Felton, M. : Superior Mesenteric Artery Syndrome. J. A.M.A. 179:257-263, 1962.
32. - Reichert, F. L. Chronic duodenal stasis; syndrome with neurological symptoms. California y west Med. 49:37-1938, Cited by Jones, S. A., et al. (17).
33. - Robinson, B. : Dilatation of the Stomach from -

- Pressure of the Superior Mesenteric Artery, -
Vein, and Nerve on the Transverse Segment of
the Duodenum. *Lancet Clinical (Cincinnati)* -
45:577-586, 1900. Cited by Goin and Wilk -
(15).
34. - Rokitansky, C.: *Lenhrbuch des Pathologischen
Anatomie*, Ed. e, Vol. 3 Wien, 1863. Cited by
Taylor and Hollander R. J. (40).
35. - Romogosa, J., and Menville, L. J.: Chronic -
Intermittent Arteriomesenteric Occlusion of -
Duodenum, *Radiology* 57:63-65 (July) 1951.
Cited by Tyson and Keegan (43).
36. - Rosenberg, S. A., and Sampson, A. The syn--
drome of mesenteric vascular compression of -
the duodenum. *A. M. A. Arch. Surg.* 73:296,
1956. Cited by De Vito (12).
37. - Shrum, R. C. Duodenal obstruction due to pre-
ssure of superior mesenteric vessels. *J. A. M. A.*
148:550, 1962. Cited by De Vito (12).
38. - Simon, M. and Lerner, M. Duodenal compre-
ssion of the mesenteric root in acute pancrea-
titis and inflammatory conditions of the bowel.
Radiologg, 79:75, 1962. Citey by McKinnon
and Spender (25).
39. - Strong, E. K. Mechanics of arteriomesenteric
duodenal obstruction and direct surgical attack
upon etiology. *Ann. Surg.* 148:725, 1958. -
Cited by McKinnon and Spencer (25).
40. - Taylor M. T., and Hollander R. J.: Arteriomesen

teric Duodenal Obstruction in the Newborn. *Infant. Pediat.* 31:1049-1050, 1963.

41. - Testut. L. y La tarjet, A. : *Tratado de Anatomía humana, Tomo IV, Barcelona Buenos Aires, Salvat Editores, S. A. 1947.*
42. - Tinkhan, H. C. : Chronic arteriomesenteric obstruction of duodenum. *Boston M. E. S. J.* 188: 398-401 Mar. 22 1923. Cited by Berley and Brown (3).
43. - Tyson. W. T., and Keegan. J. M. : Duodenal obstruction due to compression by superior mesenteric root. *J. A. M. A.* 165: 1665, 1957.
44. - Waltman. W. : *Lewis Practice of surgery Vol. VI. Hagerstown, Maryland, W. F. Prior Company, Inc. 1949.*
45. - Weeks, A., and Delprat, G. D. : Arteriomesenteric Occlusion of Duodenum. *S. Clin North América* 8: 1537-1540 Dec. 1928, Cited by Berley and Brown (3).
46. - Welch, E. Cl. : *Cirugía gastroduodenal México, Editorial Interamericana. S. A. 1959.*
47. - Wilkie, D. P. C. : Chronic Duodenal Ileus. *Brit. J. Surg.* 9:204-214, 1921: *Brit. J. Surg.*, 9: 204, 1921. Cited by Taylor and Hollander (40)
48. - Williams L. F., and Bowers, W. F. : Arteriomesenteric duodenal obstruction Associated with severe peptic ulcer disease *Ann Surg.* 153: - 250, 1961. Cited by McKinnon and Spencer (25).